
This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

GoogleTM books

<https://books.google.com>




NATIONALBIBLIOTHEK
IN WIEN

165880-~~A~~B

Neu-



Österreichische Nationalbibliothek



+Z253507800

V Ě N A C.

SBIRKA POUČNÍH I ZABAVNÍH SPISAH

za

MLADEŽ I NAŠ PUK.



Izdaje

Věnceslav Zaboř Mařík.

Knjiga III.

**Cèrtice i pripověsti o dvoživcih, ribah
i mekušcih.**



U Zagrebu.

Vlastitim troškom Lavoslava Hartmána.

1865.

CÈRTICE I PRIPOVĚSTI

o

dvoživcih, ribah i mekušcih.

Sa 41 bojadisanom slikom.



Sastavio

Věnceslav Zaboř Matík.



U Zagrebu.

Vlastitim troškom Lavoslava Hartmána.

1865.

165880-B

Digitized by Google



Tiskom Jermenskoga Monastira u Beču, 1865.

III. Vodozemci.

(*Amphibien*).

I. Kornjače.

(*Schildkröten*.)

Kornjače ili **željve** imaju kratko, skoro okruglasto tělo, koje im je koštanim oklopom ili štitom pokriveno. Imaju 4 noge. Zubih neimaju. Oklop ovaj sastoji se iz dvajuh štitah. Gornji ili hěrbteni štit srasao je s hěrbtenicom i rebri, a dolnji ili pěrsni s pěrsenjačom. Oba štita skopčana su te pokrivena ili rožastimi pločami ili tvěrdom, žilavom kožom. Sa strane ima željva rupe kamo uvlači glavu, noge i rep. Jezik joj je mesnat i kratak; pa nemože ga izpružiti. Željve su věrlo lagane životinje. Hrane se ponajviše biljem; řědko kad manjimi ribicami i mekušci. Kada hoće željve da jaja snesu, izdube jamicu u pěsku, i u nju snesu svoja kožasta jaja. Mlade kad se izlegu imaju mekani oklopac; jedva se izlegu, traže odmah vodu. Život im je toli čvěrsto ustrojen, da mogu 6—8 měsecih živiti, da ništa nejedu; pače ako im i moždjane izvade, mogu se još několiko měsecih gibati. Željve rastu polagano; ali žive věrlo dugo. Ima priměrah, da su u zatvoru živile do 50 godinah. One su izmedju svih

vodozemacah najkoristnije. Od njihovih oklopacah prave se razne stvari, najme češlji, burmutice, nožne korice i t. d. Meso im se jede, pače vele, da je vrlo tečno. I jaja njihova dèrže mnogi za poslastne. Blizu nekih rëkah u Americi sakupe svake godine preko 30 milijunah tih jajah, iz kojih se pravi ulje, koje je, kako vele, veoma dobro. — Željvah ima više vèrstih. Ovamo spadaju:

- a) Gèrčka željva (Griechische Schildkröte, tabl. 13., sl. 1). Ima na hèrbtenom štitu žute ploče sa cèrnimi pëgami. Živi u južnoj Europi, imenito u Dalmaciji, Gèrčkoj te Italiji. Živi i na nekih otocih srëdozemnoga mora, pače i u Banatu i Francezkoj. Najvoli pëskovite šume. Hrani se biljem, voćem, korënjem, puževi i cèrvi. Mëseca sèrpnja ili kolovoza snese do 12 jajah, pa ih zakopa u zemlju. Ta jaja velika su kao orah. Koncem rujna izvale se mlade. Gèrčka željva duga je 1' a važe do 4 funta. Dèrže ju gdëgdë i u vèrtovih, da utamani cèrve i slični gad. Meso joj se jede.
- b) Skrižalica (Geometrische Schildkröte, tabl. 13., sl. 2) ima na hèrbtenom oklopu cèrne ploče sa žutom pëgom u srëdini, odakle se šire žute pruge tvoreć tako geometričke slike. To je vrlo lëpa željva; živi na obalah južne Afrike.
- c) Europejska željva (Europäische Sumpf-Schildkröte, tabl. 13., sl. 4) zeleno-cèrnkaste boje sa žutimi piknjami, redomice nanizanimi. Živi u močvarah blizu rëkah, ribnjakah i jezerah. Nalazi

se većom stranom u južnoj Europi, naime u Francuzkoj i Italiji; nu možčš je naći i u Ugarskoj i južnoj Ruskoj, pače u Poljskoj i Pruskoj. Ima joj 10 palacah. Jaja snese blizu vode na suhom; hrani se ribicami, puževi i cèrvi. Meso njeno jede se.

- d) Crěpovita željva (Karett-Schildkröte, tabl. 13., sl. 3) ima na hěrbtenom oklopecu ploče, koje joj poput krovna crěpovlja tělo pokrivaju. Duga je $2\frac{1}{2}$ —3' a važe do 200 funtah. Jede morsko bilje, rake, mekušce i male ribe. Měseca svibnja, lipnja ili sěrpnja nosi jaja. Od nje se dobiva poznata željvina (Schildpatt)), od koje se prave burmutice, češlji i. t. d. Od jedne željve dobiva se 8—10 funtih željvine. U svakoj pogibelji odvažno se brani, pa s toga ju je težko uhvatiti. Njezina jaja věrlo su tečna; nu meso nevalja ništa, pače kažu, da je i nezdravo. Živi u indijskom i u velikom oceanu.

Golema željva (Riesen-Schildkröte, tabl. 13., sl. 5) ima smedje, maslinkasto-valovite ploče na hěrbtenom štitu. Često je duga 6—7 stopah; a važe 700—800 funtih. Hrani se morskim biljem. Od mėseca svibnja do kolovoza nese po triput jaja. Kada dodje vrěme, daležu jaja, izadje ih na tisuće na kopno, tu izkopaju u pěsku jamice, u koje snesu za nekoliko minutih do 100 jajah, te ih pěskom pokriju. Ta su jaja okrugljasta te velika kao jabuka. Za 6 tjednah izlegnu se mlade željve, koje odmah silaze u vodu. Kažu da ova željva stopěrv u 20. godini prestane rasti. Živi jako

dugo. Goleme željve žive u velikih jatih na toplijih obalah atlantskog mora, gdje ih ljudi na tisuće hvataju. Već su ih ulovili i u sredozemnom moru. Kada ju love, nebrani se. Love ih osobitim načinom. Kada izadju naime na kopno, da snesu jaja, dodju mornari, prebace ih na hêrbat pa tako odpreme na ladju, ili ih s mēsta ubiju i nasole. Često natovare cēle brodove nasoljenim njezinim mesom, koje je tako tečno, da ga u Englezkoj bogataši smatraju za poslasticu. Iz mesa pravi se osobita juha. Mast i jaja rabe se dakodjer.

Usonjača (Leder-Schildkröte) ima mekan i žilav oklop. S gora je cerno-sure, a s dola suro-žute boje. Ta je najveća željva. Ima joj 7—8 stopah a važe 800—1000 funtih. Živi u atlantskom i indijskom oceanu. Kad i kad dodje i u jadransko more. Na afrikanskih i amerikanskih obalah snese četiri putah na godinu po 200—250 jajah. Iz njezina sala pravi se ulje.

Gèrčka željva, skrižalica, željva evropejska, crëpovita i golema, kao i usonjača i još nekoje druge sačinjavaju razred **željvah** ili **kornjačah**.

III. G u š t e r i.

(Eidechsen.)

Obična gušterica (gemeine Eidechse) ima oko ustnicah fine, šiljate zube; jezik joj je dug, tanak i na dvoje razcëpan. Na prednjoj polovici tēla ima četiri

pandjama oboružane noge. Tělo joj je malimi ljuskami pokrito. Živi skoro u čeloj Europi. Boje je raznolike; obično pako sivo-zelenkaste, sive ili zelene. Uzduž hěrbta proteže se smedjasti potez. Duga je 6—7 palacah. Najvoli se baviti pod gěrmľjem, medju kamenjem, u starih zidinah, pod listjem i t. d. Sunce joj věro godi. Věro je okretna. Jede bube, pauke, mlade žabe, pače i svoje vlastite mlade. Čověka se baš puno neplaši, pače pokazuje, da mu je privěržena; nu višeputah ga ipak ugrize, premda to nije ni malo pogibeljno. Bez hrane može 5—6 měsecih živiti. Kad nastaje hladno vrěme, zavuče se kamo god u šupľjo děrvo, u zemľju ili u pukotine zidinah, pa tamo prospava čělu zimu. U prolětje izadje opet na vidělo, pa svuče svoju kožu. Ženka snese 5—8 bělkastih jajah po prilici onako velikih kao što su vrabčeva. Ta jaja, koja su pokrita kožnatom ljuskom, sjaju něko vrěme tako u tmimi, da možeš u blizini sve predmete razpoznati. Uslěd sunčane topline izlegnu se iz njih mčseca kolovoza mlade gušterice. Gušterice věro su nam koristne, jer tamane svakaku škodľivju gmazad, nu višeputih nam ipak škode, što zalaze u pčelinjake i košnice te utamane mnogo pčelah. — Lisica, sova, divľje patke, rode i druge životinje love ih, gdě god mogu.

Zelembač (grüne Eidechse) velik je gotovo još jedan put kao prijašnja. Boje je lěpo zelene s čěrnimi piknjicami. Živi kao prijašnja, samo što nije tako plašľiv. Kažu, da se umije i sa zmijami boriti, pače da skoči i samomu psu na nos. Jede skakavce, bube, pače

i mlade ptice, ako im samo dodje do gnězda. Može se pripitomiti. Vodu pije vèrlo često.

Dvoličnjak (Chamäleon, tabl. 14., sl. 4). Truplo mu je sa stranah spljošteno. Rep dugačak, kovèrčast. Na noguh ima tri pèrsta spreda, dva straga; jezik mu je dug a može ga hitro i daleko izplaziti. Plèn svoj hvata jezikom tako vèšto, da mu redko koji kukac izmakne. Boju često mènja, i to uvek ako je sèrdit, razdražen ili veseo, ako je u tmìni ili na svètlju. Od toga mu je ime dvoličnjak. Sad je sivo-sure masti sa žutimi i ljubičastimi pègami i prugami, sad opet jasno-žute sa narančastimi pègami, ili je bël kao kreda, što obično noćju biva. Samac je manji od ženke, koja snese 15—20 jajah, te ih sakrije u lišnje dok se izlegnu mladi dvoličnjaci. To je neškodna životinjica; boravi na gèrmlju i dèrvetju. Jede bube i pauke; najradje pako hvata muhe, s toga ju u njezinoj domovini dèrže u sobah. Živi u Egiptu, Tunisu, u južnoj Španjolskoj i na otoku Siciliji. Dvoličnjak je prilično lèn. Znamenit je još i s toga, što može svakim okom nezavisno od drugoga svakamo kretati.

Legvan (Leguan, tabl. 13., sl. 7) je modro-zelen, rep mu je smedjimi kolutići opasan; vrat sa strane bobičastimi ljuskami pokriven. Velik je do 4—5 stopah. Živi u vlažnih krajevih južne Amerike; jede lišnje i voće, cèrve i zarèznike. Dèrži se obično na stablih. Dok ga nitko nerazdraži miran je; ali kad se razljuti, skoči na svoga neprijatelja, te se tako čvèrsto zasèče u meso, da se ga nemože osloboditi, dok ga neubije.

Ženka snese u kišovito vrēme do 60 kao golubja velikih jajah, o kojih kažu, da su veoma tečna. Na stablu je vērlo okretan, te skače vērsto od grane na granu. Kad se do sita najede, tako olēni, da ga mogu lahko uloviti. Pliva nespretno. U mnogih krajevih love ga u zanjke ili sa psi. Meso mu jedu; vele da je vērlo dobro, premda dosta nezdravo.

Bazilisk (Basilisk, tabl. 14., sl. 5) vērlo je nevina životinja, poznata osobito sa kožnate kērpe, što ju ona ima na zatiljku. Ledja su mu do polovine repa češljasta. Boju ima modrastu, a dug je do 3 stope. Živi u Americi, imenito u Meksiku, Guiani, Martiniku i t. d. Dērži se na stablih, skačuē od jedne grane do druge. Stari su o njem koješta pričali. Tako su pripovēdali, da mora svaki umrēti, koga bazilisk pogleda; da je tolika moē u njega te može njive i livade osušiti, pače i najčvrstje klisure razvaliti. Čovēk se može samo na taj naēin spasiti, pripovēdahu takodjer, ako prēd njim dērži ogledalo, jer ēe tada bazilisk od ljutosti i jada poginuti, ili ēe ga ubiti vlastiti mu pogled.

Zeleni zmaj (der grüne Drache, tabl. 14, sl. 6) ima o guši kožnat tobolac, a na strani medju dolnjimi rebri razastērtu pērutnicu. Boje je zelene a perutnica mu je smedja. Dug je 1—1¼ stope. Živi u iztočnoj Indiji, na Javi i Borneu. Boravi na dērvetju. Pomoēju svojih perutnicah može 20—30 stopah daleko skočiti. Letēti nemože. Jede bube. Sa stabla redko kada silaze; hode vērlo mučno i nespretno. Jaja snesu u šuplo dērvo. — Stari su koješta bajali o zmaju, pače

ima i danas još ljudi, koji mnogo toga umiju o njem pričati. To su dakako sve puke izmišljotine, česa mi i netreba dokazivati.

Psoglavka nilska (Krokodil) ima truplo ponešto plosnato, a i rep joj je sa strane spljošten; dočim su joj ledja pokrivena koščastimi sedlastimi korami. Kratke su joj noge providjene pèrsti a ove opet pandjama; na stražnjih noguh ima i plivačnicu; sgora je maslinkasto-zelene boje sa čèrnimi pègicama. Dug je 25—30 stopah. Živi u afrikanskih rèkah i jezerih, naime u Egiptu i Senegambiji, na otoku Madagaskaru i t. d. Noću sastanu ih se u vodi čitave hèrpe; danju pako spavaju mirno i tiho na obalah. Kad zavlada velika vrućina, otvori psoglavka svoje ralje, te ih dèrži otvorene. Često joj uleti u nje gdèkoja ptica, hvatajuć tamo muhe, al se opet živa i zdrava vrati. U prolétje snese ženka do 100 jajah, zakopa u pèsak, te ih vèrno straži i čuva. Ova su jaja tako velika kao guskinja. Lupina im je veoma tvèrda. Promika i jedna vèrst gušterah traže ta jaja, i jedu ih. Za jedan mèsec izvale se mlade psoglavke, koje su pò stope već duge, te istom što se izlegošè, traže si vodu, gdè ih ribe mnogo pojedu. Psoglavka jede sisavce, ptice, dvoživke i ribe. Često se dogodi te ona povuče u vodu kravu, vola, pače i konja, kada dodju na vodu; a ima primèrah, da su i čovèka utopile i pojele ga. To je u obće vèrlo proždèrljiva životinja; nu kad se najede, onda olèni. Raste polagano i živi veoma dugo, pače ima ih, vele, koje su i više od 100 godinah preživèle. Meso i salo joj jedu, premda ne-

ugodno zaudara po mošku. Kažu, da se psoglavka daje prilično pripitomiti, samo ako se dobro hrani, pače na afrikanskom otoku Bourbonu tove ih i dèrže kao domaću životinju. U drugih krajevih Afrike hrane ih u ribnjacih, pa se često tako pripitome, da děca na njih i jašu. Stari Egipťjani obožavahu ju a kad je poginula, namazaše ju dragimi mastmi i zokopaše tamo, gdje i svoje kralje. U Arsinoi u Egiptu bio je posebni hram, gdje su svetjenici uvek hranili jednu psoglavku, božansko štovanje joj izkazujuć. Ova psoglavka bijaše uvek urēšena zlatom i dragim kamenjem.

Psoglavka seheljska (der asiatische ili Leistenkrokodil) naliči prijašnjoj. Živi u južno-azijatskih rēkah, na otoku Javi itd. Kadšto duga je i do 20 stopah. Ljudim su te dvoživke veoma pogibeljne, a osobito na otoku Borneu, gdje ih ima neizmijerna množina.

Kajman (Alligator, tabl. 13., sl. 6) naliči sasvim psoglavki. Dug je do 10—12 stopah. Živi u južnoj i srēdnjoj Americi, i to u jezerih, rēkah i močvarah. Kad nastane suša, zakopa se sav u blato tako, da mu samo glava viri van; u takovu položaju udaraju tamošnji stanovnici nanj. Salo njegovo rabe što za svētlilo, što pako, smēšav ga sa smolom, za mazanje brodovah. Ženka snese gdjeđod u gēmlju ili u pēsku 20—24 jajah, koja listjem pokrije. Hrani se sisavci, pticami, dvoživkami i ribami. Vēro je proždērljiv, te se često događja, da i čovēka sgrabi i poždere. Premda je lov loviti na kajmane stvar vēro pogibeljna; to ima ipak ljudih, kojim je on neizmērno veselje. Kad Ameri-

kanci saznadu, gdje se kakov kajman obično sunča, sakupe se u veliko društvo a svi su naoružani puškama i džiliti (Wurfspiess). Kad se približe kajmanu uzmu nanj pucati, nu moraju ga sgoditi upravo u térbuh, jer mu tane nemože drugčije ništa nahuditi, budući je s gora pokrit tvèrdom kao korom. Ako ga neubiju iz puške, bacaju nanj džiliti tako dugo, dok ga ubiju. Nu najpogibelniji je kajman svakako u vodi, jer je vèšti plivač. Tu ga je teško ubiti. U takvih prilikah uzmu ljudi oštro željezo, nasadjeno na dugačkom dèrvenom dèržalu, pa kad kajman otvori ralje, da koga ugrabi, mora mu se u taj mah ono oštro željezo u ždrèle porinuti. Jao onomu, koji promaši u bacanju, taj mora propasti.

Gavial (der Gavial) ima dugačku i vèrlo uzku gubicu; boje je zelenkaste s cèrnimi pègami; živi u velikih društvih u nèkojih indijskih rèkakh u Aziji. Dužina mu iznosi 18—20 stopah. Jede ribe, navaljuje i na pse, teliće, pače i na same ljude. U želudcu jednog gaviala našli su ostanke od nèke ženske kao i od psa, mačke i nèkoliko pèrstenah, što ih Hindustanci nose. Hindustanci dèrže ga za svetu životinju, pa si prave na čelu svete znakove nèkom žutkastom, po mošku dišućom stvarju, što je ima gavial na glavi. U prijašnje doba trèbali su ga Hindustanci kod tako zvanoga božjeg suda; okrivljenik bo je morao u prisutnosti braminah, indijskih svetjenikah, plivati preko rèke, u kojoj su gaviali živili. Ako je okrivljenik sretno prebacio rèku, proglasili su ga nevinim.

Slěpić (Blindschleiche) izgleda kao zmija a dug je do $1\frac{1}{2}$ stope. Tělo ima tanko, valjkasto i malimi ljuskami pokrito. Boje je sjajno mēdaste, ozdol cěrnkaste. Mladi slěpići su ozgo sjajno žutkasti ili cěrvenkasto-běli. Rep mu se lahko prekine, nu nije istina, da bi mu opet narasao, kao što mnogi misle. Kožu slěpić svlači svake godine pet putah. Živi skoro u čitavoj Evropi. Měseca listopada ili studenoga zavuče se u zemlju, pa tu prezimi; mēseca pako ožujka izadje vani. Jede puževe, cěrve i bube. Može i pol godine gladovati. Kad je gladan, pojede glistu, koja je tako velika kao polovica njegova těla. Ženka snese mēseca kolovoza 8—10 jajah, iz kojih se tek što ih snese, izlegnu mladi slěpići. Slěpić je lěpa i věro krotka životinjica. Nije ni nimalo otrovan, premda naš narod protivno tvěrdi. Slěpiću je ime odtuda, što su mu oči tako malene, da ih je jedva viditi, s toga mnogi misle, da je slěp.

Obični gušter, zelembač, dvoličnjah, legvan, bazilisk, zmaj, psoglavke, kajman, gavial i slěpić imaju 4 noge (slěpić ih neima), a u čeljustih oštěrljaste zube. Rep im je dugačak; koža je ljuskami ili štitovi pokrita. Sve ove životinje zovemo **gušteri**. U predpotopno doba življaše mnogo veoma velikih gušterah, koji su se odlikovali posebnim oblikom těla.

III. Z m i j e.

(Schlangen,)

a) Neotrovne.

Bělouška (gemeine Natter ili gemeine Wasser-Schlange) je sivo-modra hěrbta s černimi piknjicami, a bělkasta těrbuha. Sa svake strane vrata ima poput poluměseca bělkaste ili žutkaste pěge. Duga je obično 4 stope; nu vele, da ih ima i 7 stopah dugih. U starosti su prilično debela těla. Počam od mēseca travnja ima ih posvuda u stojećih vodah, močvarah i na crětovitih livadah. Bivaju i kraj kućah, u plotovih, gěrmlju, u gnoju i t. d. Čestje ju možeš naći u stajah, podrumih, pače kad i kad i u samoj postelji. Sunce joj věrlo godi. Věšto pliva. Mēseca sěrpnja ili kolovoza snese 12—20 kao golubja velikih jajah. Ova jaja imaju kožnu ljusku, te su skopčana rekao bi koncem. Polazu ih obično u gnoj ili u glibovitu zemlju. Za 3 nedělje izlegnu se iz njih mlade zmije, koje dosta dugo žive uzajednici. Mēseca listopada ili početkom studenoga uvuče se u gnoj ili u zemlju, te tamo prezimi. Jede miševe, ribe, male žabe i t. d. Osobito rado jede mlěko, te s toga zalazi u podrumě i kuhinje. Nije nimalo otrovna, niti nečini kakova ina kvara.

Naš puk zove běloušku čuvaricom kuće, te kaže, da ju nevalja ubijati, ako nećemo da propade sva sreća u kući, gđe bi se kućna ova čuvarica ubila. Vele takodjer, da nevalja gđegod pod stablom ili na livadi spavati, jer bi se mogla lahko zmija kroz usta u těrбуh uvući, te bi morao čověk silne muke podnositi.

Osim toga kažu, da pogled te zmije toli djeluje na nekoje životinje, da se nemogu s mjesta maknuti, dok god ih ta zmija gleda.

Može se tako pripitomiti, da poznaje svoga gospodara. U sužanjstvu može prilično dugo živiti, ako joj se daje uvijek potrebite vode.

Udav povodni (die Anaconde — Riesen-Schlange) najveći je među svimi zmijama. Njegova dužina doseže do 40 stopah. Deblji je od čovječjega stegna. Boje je maslinasto-zelene. Živi u Braziliji uz močvare, jezera i rijeke blizu tamošnjih prašumah. U vodi može jako dugo boraviti. Vrlo je proždrljiv. Hrani se ponajviše ribami, nu napada i ptice i sisavce, naime i sèrne, kada k vodi dodju, da se napiju. Životinju uhvati zubi, omota joj se oko tjeła, stisne ju, te joj tako sdrobi kosti. Plēn negriže, već ga cēlcāt guta, kao što čine sve ostale zmije. Da ga laglje progutne, razvali strašno ždrēlo, poslini plēn, da bude osklizan, pa ga progutne. Ako nemože, da proždere preveliku životinju, to mu jedna strana iz ustijuh visi, dokle god nesagnjije. Bori se višeputah i sa kajmanom, a obično ga svlada. Kada nastaje velika suša, te izsahnu močvare, zavalu se udav dublje u blato, pa često strašno ruči. Dosta je bojazljiv; prēd čovēkom bēži. Tamošnji stanovnici ga ubijaju strēlami; rabe kožu njegovu za obuću, vrēće i t. d. Radja žive mlade, koji su do 2 stope dugi.

Udav obični (Königs-Riesen-Schlange, tabl. 14, sl. 1) manji je od prijašnjega. Dužina njegova iznosi 20—30 stopah. I taj živi u Braziliji, Guiani i Su-

rinamu u južnoj Americi. Bavi se na suhih městih, u gèrmlju, šumah, podzemnih rupah, pukotinah i t. d. Višeput nadje ih se 4—5 zajedno. Čestje popne se i na stablo, te čeka tamo svoj plén. Jede ptice i manje sisavce; nu napada i sèrne. Čověka se boji. Tamošnji stanovnici hvataju ga u zamke; koža i mast dadu se upotřebiti. Može se i pripitomit.

Kravesas šareni (die Tiger-Riesen-Schlange) živi u iztočni Indiji, Kitaju, na otoku Sumatri i Javi. Dug je 25—30 stopah, a u tělu je deblji od čověčjega stegna, pače vele da je deblji nego odrasli čověk u tělu. Boje je suro-žute s velikimi smedjimi pėgami. Boravi ponajviše na stablih i kraj rėkah. Něki častnik pripovėda o njem slėdeći slučaj: Ja sam stanovao na kraju najznatnijega grada na otoku Cejlonu, a prozor mi bijaše okrenut prama bližnjoj šumi. Ne daleko od moga stana dizaše se maleno bėrdašce, a na njem stajahu do tri četiri palme, koje su me svojom krasotom svako jutro vėrlo razveseljivale. Pogledav jednim jutrom jednu od njih, pričini mi se, da joj se jedna grana čudnovato giblje; sad se kreće s jedne strane na drugu, sada k zemlji privija, sad opet u vis diže i medju grane zamėršuje. Vėtar nije duvao, zrak je bio sasvim miran, te sam o tom prizoru svašto promišljao, kad al' mi něki Cejlonac u pohode dodje. Pokažem mu to golemo čudo; on pako baci vši oko na rečeno dėrvo, prohlėdi sav u lėcu i malo da se od straha na tle nesruši. Zamoli me, da umah sva vrata i prozore zatvoriti dadem: jer ono, što ja za granu dėržah, veljaše mi, da je go-

lema zmija, koja se nasladjuje takovim nijananjem, te se k zemlji spustja, da što plěna ulovi.

Skoro se osvědočih, da je pravo imao; jer malo zatim vidih, gdě je ona malu životinju na zemlji uhvatile, i sa sobom medju grane odněla. Kad sam uzeo Cejlonca o toj nakazi potanje izpitivati, reče mi, da ju na otoku vërlo dobro poznaju, da ona obično srěd šumah boravi, te se sa gusto zarastjenih obalah na prolazeće ljude ili životinje obara i žive ih proždire.

U to se nas dvanaestorica sakupimo, i dobro naoružani izjašemo za gérmlje, odakle smo zmiju iz pušakah pogoditi mogli. Kad smo ju s bliza razmatrali, i njezinu ogromnost, koja s daleka tako u oči neudara, opazili, obuze nas groza, i nitko nije smio, da na nju puca, bojeć se da ju nepogodi. Svi Cejlonci, što su kod mene bili, uvěravahu, me da je ova veća od svih zmijah, što su ih dosad vidili. Bila je deblja nego tělo odrasla měršava čověka, no nije se vidila tusta, te je prama svojoj debljini vërlo duga bila. Repom se je zavėsila o najvišu kitu od stabla, a glavom je do zemlje dopirala. Bila je vërlo okretna, te se je tělom za čas u hiljadu načinah savila. Sad je dolě splazila, rep oko stabla omotala i na tla se pružila a za čas je medju grane izčeznula. Srěd toga skakanja opazimo, da se je kao munja stegnula i polagano medju svěrži sakrila. Skoro smo uvidili uzrok tomu: malena lisica, koju je ona po svoj prilici smotrila, htěde da pokraj stabla prodje; no zmija se na nju spusti, i u několiko ju minutah svu izsisla. Širokim i cěrnkastim jezikom stade

lizati njezino meso, i dočim se je sasvim udobno po tlih pružila, rep joj je uvek o stablu omotan bio.

Motрили smo ju dugo, pa kad smo se je nagledali, opalimo puške prama glavi: no neznam, da li ju je u isti čas krenula, ili da li nismo mi dobro nišaniли, bilo što mu drago, mi je nismo pogodili, pa ona se nije ni najmanje prenula, već je na tlih onako pružena ostala. Sad se je već smèrknjivalo, te mi udlučimo doma poći, i sutradan se u većem broju vratiti. Cejlonci kazaše, kad si ta zmija koje stablo za stan izabere, da ga tako na skoro neostavlja.

Sutradan privučemo se k istomu gèrmlju, no u mnogo većem broju, pa nadjemo zmiju na istom mèstu. Činilo se, da je vèrlo gladna, pa na skoro opazimo, čemu smo se čudom čudili.

Jedan tigar, što nije bio mnogo manji od krave, dodje pod stablo, na kom se je ona nalazila. Za čas začujemo srèd granah strašan šum. Zmija se obori na tigra i pograbi ga za ledja, te mu odkine komad tēla, koji je bio veći od čovèčje glave. Tigar zarikne strašno i htēde da sa svojim neprijateljem pobègne; no kad to zmija opazi, omota se dva tri puta oko tigra, te ga tako stisne, da se je ovaj na tla srušio. Kad ga je zmija tako stegnula, ostavi mu ledja, pomakne se prama glavi, otvori svoje ždrēlo, koliko je mogla, te zahvativši tigru cēlo lice, stadē ga strašovito mèrcvariti, dočim mu je ujedno zatvorenjem zraka odisanje preprèčila. Tigar se stadē u vis dizati, s jedne se strane na drugu obra-tjati i zmiji u ždrēlu strašno rikati.

On je bio vrlo jak i odvažan, te premda nije mogao da se zmije reši, zadao joj je ipak dosta truda. Sad se je na stražnje noge osovljavao, sad opet dalje běžao, dok se napokon nesruši, stranom poradi zmijine težine, stranom porad svojih preveć uzko stegnutih udovah. Za nekoliko satih činio se je sasvim iznemogao i mrtav. Zmija je pokušala, da užim stegnutjem svoga tela tigru rebra i kosti sdrobi; nu to joj nije uspelo. Razvije se dakle od tigra, i omotavši mu samo rep oko vrata, povuče ga težkom mukom prama stablu. Sad smo jasno uvidili, čemu joj stablo služi.

Buduć tigar nije mogao, više da ravno stoji, prislonila ga je uz stablo nogami u vis . . . Poslije toga omotavši svoje telo toli oko tigra, koli oko stabla, stegnu se sa svom snagom, dok je napokon rebro za rebrom, kost za kostju slomila i sdrobila. Kad je bila s telom gotova, baci mu se i na noge, koje je takodjer na pet šest mēstih sdrobila. Isto dako hotēla je da i s lubanjom učini; no nakon duga uzaludna napora okani se toga posla, te buduć joj nije više mogao po-
bēći, povuče se medju granje od stabla.

Tretji dan nismo iza gērmlja od tigra ništa više vidili nego cērljenu mērcinu, koja je bez svake slike žutom balom oblivena bila. To je sve ležalo nešto dalje od stabla, a zmija se je tim gostila. Sad je upravo sēr-
kala mozag iz lubanje, pa zatim je progutnula ostalo telo. Nu to joj je mnogo truda zadalo, te dodje prije večer, nego je cēloga tigra proždērla.

Četvērti dan došlo je s nami na isto mēsto mnogo

ženah i dēce; jer veljahu, da se nije sada više nikakove pogibelji bojati. Osvēdočio sam se, da je upravo tako bilo; jer zmija se je prejela bila, te niti se je braniti, niti pobēći mogla. Kad smo se približili, hotēla je, da uz stablo uzplazi, no uzalud. Cejlonci su ju ubili, njezino meso, što je teletini naličilo, skuhalo i vērlo tečno pojēli. (Gimn. čit.)

Bēlouška, udav i kravosas spadaju medju **neotrovne** zmije. One imaju samo jedan niz zubih u gornjoj čeljusti.

b) Otrrovne zmije.

Bidevka (die Kreuz- ili Kupferotter, tabl. 14, sl. 7) ima uzduž svoga sivo-smedjega hērbta mērku, vijugastu prugu ili pojedine mērke ljage, koje su na šiji gotovo kao unakērst složene. Ta zmija zavučē se mēseca listopada ili studenoga u svoju podzemnu rupu, i tu prezimi, a mēseca ožujka izlazi opet van. Ljubi toplinu, a osobito joj gode sunčani trāci; s toga ju možeš često naći, gdē se sunča. Boravi osobito rado na nizkom gērmlju, ili medju kamenjem, u šupljom dērvetju i t. d. Živi isto tako na visokih brēgovih, kao i u močvarnih nizinah. Rupah si nepravi nikada sama, nego potraži gdēgod miševu ili kērtovu. U blizini svoga stana leži obično cēli dan, sunčajuē se i čekajuē, dok se približi kakov miš, kojega najprije otruje a onda proždere. Dok je mlada, hvāta samo mlade guštere, a kad uzraste,

lovi miševе, mlade ptice, rovke, mlade kèrtove, žabe i guštere. Može gladovati do 9 mēsecih, premda je obično tako proždèrljiva, da proguta 2—3 miša zasebice. Hoće li ridovka kakov plēn uhvatiti, svine vrat, pa ga onda hitro izpruži i tako životinjicu ulovi. Za plēnom nikada neskače. Kada se razljuti, napuhne se, baca sobom amo tamo a oči joj rekao bi, munjom sēvaju. Bosim ljudem dogodi se često, da ih ridovka ujede; s toga bi valjalo, da dēca osobito paze, kad беру jagode. Koga ta zmija ujede, može za 50 časovah i umrēti. Nu ako je koga ugrizla, najbolje je, da se odmah ono mēsto izreže, kèrv izsisā i ako je moguće, usjalim željezom izpali. Dakako osim toga treba odmah i lēčnika u pomoć pozvati. Otrovnost od starih zmijah pogibeljniji je, nego od mladih. Ridovka snese 5—14 jajah, u kojih su već žive mlade, koje se odmah izlegnu. Stara se ni najmanje nebrine za svoje mlade. — Najveći neprijatelji ridovkah jesu: jež, jazavac, tvorac, roda, mišar i t. d.

Pěskuša (Sandviper) slična je našoj ridovki, samo što ima na gornjem kraju gubice mekan rožčić. Velika je obično 2½ stope, a debela je često kao dētinja ruka. Ta je najotrovnija zmija u Europi. Živi po pěskovitih i kamenitih brēgovih u Hèrvatskoj, Dalmaciji, Istri, Kranjskoj i t. d. Jede miševе, male ptice i guštere.

Čegèrtuša (Klapperschlange, tabl. 14, sl. 1) živi u južnoj Americi. Duga je 5—6 stopah a debela kao rame odrasloga čovēka. Boje je maslinkaste sa

velikimi černimi i bělo-obrubljenimi pĕgami na hĕrbtu, slične manje ima po stranah. To je najotrovnija zmija u Americi. Da ěegĕrtuša ugrize ěovĕka, morao bi za 10—12 ěasovah umrĕti. Źivi u suhих, pustih i šumskih krajinah. Lĕna je i polagano se kretje. Obiĕno leŹi smotana; ako spazi gďĕ u blizini kakovu Źivotinju, digne rep visoko, te njim klopотje. Ima bo na kraju repa nĕko od rogovitih pĕrstenah sastojeĕe klopotalo, kojim kad je suho, klopотje. Źivotinje, koje se pribliŹe njoj, tako se je preplaše, da nemogu ni s mĕsta, tada ih ěegĕrtuša uhvati i pojede. Jede zamorĕiĕe, zeceve, miševe i ptice. LeŹe Źive mlade, koŹu svlaĕi nĕkoliko putih na godinu, a kad se svuĕe, naraste joj na repu jedan pĕrsten više. Ovo pĕrstenje se lahko prelomi i odpade. Indijanci u Americi trebaju to pĕrstenje kao lĕk u raznih bolestih; meso njezino jedu, a salom maŹu razne rane. ěegĕrtuša se rada uvlaĕi i u same kuĕe, paĕe pripovĕdaju, da su ju veĕ i u postelji našli. Nĕtko pripovĕda o njoj slĕdeĕi sluĕaj: „Jednoĕ sam pisao u svojoj sobi. Najedanput zaĕujem, kako kuharica zavikne, da se našoj kuĕi pribliŹava velika ěegĕrtuša. Ja pogledam na polje, pa spazim sbilja zmiju, koja je tek 20 stopah od mene daleko bila. Upravo omota se o stablo oraha, ĕekajuĕi, dok ĕe moji psi na nju navaliti. Repom je neprestano klopotala, a to klopотanje bilo je naliĕno štropotu, što ga ĕini brusar bruseĕ škare. Źdrĕlo bijaše otvorila. Moja dva psa, koji su hrabro napadali i samoga vuka, tako se prestraše, da nisu ni makli se s mĕsta. Isto tako bijaše i s maĕkami, koje stajahu kao

okamenjene. Tad se čegèrtuša razmota, protegne se prama psom i mačkam, koje, su vèrlo oprezno i pazljivo uzmicale. Medjutim uzmem ja pušku, te ju ubijem. Nu ni k ubijenoj čegèrtuši, nehtědoše ni psi ni mačke na domak.

Vele, da Amerikanci, kad idu na lov u takova města, gdě ima čegèrtušah, uvěk sobom ponesu vatre, u kojoj ima željezo, kojim, ako kojega zmija ujede, odmah ranu izpale, te si tako život spase.

U sěvernoj Americi žive něka druga vèrst čegèrtušah, koje su isto tako pogibeljne kao i prijašnja. Iz kože ove čegèrtuše prave Indijanci obuću.

Naočarka (Brillenschlange, tabl. 14., sl. 2) može vrat naduti, da je kao ogèrlic (Kragen); na vratu nadutom ima něšto, što je slično naočalim, od česa je i dobila svoje ime. Živi u istočnoj Indiji, na otoku Cejlonu i t. d. Velika je do 6 stopah, i prilično je debela. Dèrži se u pěskovitih krajevih i u podzěmnh rupah. Kad se razljuti, digne se, skoči na neprijatelja, pa ga ugrize. Koga god ujede, taj mora za několiko trenutakah umrěti. Premda je ta zmija vèrlo pogibeljna, to ju Indijanci ipak mogu pripitomiti, da im pleše. Najprije izvade joj otrov iz zubih. — Doplazi često i u kuće. Hrani se pticami i drugimi manjimi životinjami. Dok ju nitko nedraži, nije čověku pogibeljna. Indijanci sakupljaju njezin otrov, pa u njem namaću svoje strěle, koje tada zadaju isto tako pogibeljne rane, kao kad zmija ujede.

U někom putopisu pripověda pisac o naočarki

ovo: „Jedne večeri sĉdili smo u kolibi na vĉrtu moga prijatelja, te se kartali. „Izиграjte, doktore!“ reĉe neki kapetan momu prijatelju. „Mir!“ odvrati doktor, blĉd kao stĉna. „Zar ste bolestni?“ upita ga drugi iz naĉega druŹtva, te hoĉe, da mu u pomoĉ priteĉe.

„Za volju boŹju! budite mirni“, odvrati on dĉrh-tjuĉim glasom. „Nemojte se ni micati, ako vam je mio moj Źivot!“

„Što hoĉe, da tim kaŹe? Zar je siĉao s uma?“ — upita nas kapetan, znatiŹeljno me gledajuĉ.

„Zaklinjem vas Źivim Bogom, nemojte se ni maknuti“, odvrati doktor, „jer ĉu, maknete li se samo, odmah propasti.“

Svi se tomu divismo. „Samo mirujte“, nastavi doktor, „pa ĉe biti s boŹjom pomoĉju sve dobro. Naoĉarka mi se omata oko stegna“.

Ove reĉi tako nas prestraĉe, da smo htĉli pobĉći, ali doktor nas tako proseĉim okom pogleda, da smo ostali, znajuĉi, da bi svaki i najmanji Źtropot bio zmiji povodom, da ujede svoju Źĉrtvu.

Tako sĉdjasmo nekoliko minutah, nepomiĉno i mirno.

„Sad se razmata“, prekine doktor zavlada vĉu tiĉinu. „Dajte za Boga ĉonesti friŹkoga mlĉka, pa ga stavite nedaleko moga stolca; ali sve tako mirno, da se niti nezaĉuje.“

Sluga odtĉrĉa, a za dva tri trenutka donese zdĉlu friŹkoga mlĉka, pa ju stavi na naznaĉeno mĉsto. „Joĉ ga nije opazila“, hoĉe doktor. — „Sad mi se ĉvĉrstje

omata oko stegna — sad diže glavu, da mu ujede — o Bože! oprosti mi grěhe i primi dušu moju u svoj raj! — Već mi je kucnuo zadnji sat! S Bogom! Pozdravite mi ženu i dčcu! — Oh! — Ha! sad se opet razmata! — Valjda će na koga drugoga!”

Ove rieči napune nas užasom a svaki od nas mišljaše da je njemu kucnuo zadnji čas; ali nitko se nije ni maknuo. „Ha! sad se je već sasma razmotala“, povikne radostno doktor. — „Evo je, ide k zděli. Sad sam spašen! Hvali ti, Bože moj!“ a u taj hip skoči doktor sa stolca, te pade svojemu slugi onesvěstjen u naručaj.

Svaki nas pograbi batinu, stolac ili šta drugo te ubijemo zmiju, koja nam je zadala toliko straha. Doktora pako smo odněli u njegovu sobu, gdje se je za kratko vrěme sasma oporavio.

Ridovka, pěskuša, čegěrtuša i naočarka spadaju medju **otrovne zmije**. One imaju u gornjoj čeljusti šuplje zube, a pod ovimi žlězde, u kojih se nalazi otrov. Ovi zubi su, dok je zmija mirna, zaklopljeni; a kad hoće ugrizti, dignu se zubi, a kad ugrizne, poteče kroz nje otrov iz onih žlězdah. Otrovn je prozračna, žutkasta i bezmirisna žitčina. Ovaj otrov škodi samo onda, kad se směša s kěrvlju. Sve zmije nisu jednako pogibeljne. Čim je zmija starija i čim veća je vručina, tim je otrov pogibeljniji. Ugriz otrovne zmije izgleda kao dva fina ubodca od igle. Nije istina, da bi zmija mogla, kao što mnogi misle, svojim jezikom ugrizti.

Sve zmije imaju na dugoljasto spruženo, valjkovito, ljuskami pokrito tělo bez noguh. Zmije mile těrbuške, mičuć sa strane trup i rep. Sve zmije slične su

si vanjskim oblikom. Ima ih po celom svetu. Dèrže se na dèrvetju, na zemlji, pod kamenjem, rëdko u vodi. Najveće i najotrovnije žive samo u vrućih krajevih. Manje hrane se kukci, cèrvljem, miševi i žabami, a veće pticami, zecevi, ovcami, sèrnami, pače jošte ovećimi životinjami, koje najprije zadave, pa onda cële progutaju. Često prožderu deblju životinju nego su same.

IV. Ž a b n j a c i.

(Lurche.)

Hvojnik (Laubfrosch) ima izpod svakoga pèrsta lèpljivu guku. Boje je sgora sjajno-zelene, s dola bël-kaste. Koža mu je ozgor gladka, a na tèrbuhu bradavičasta. Mužak ima mërko-suru gušu, koju napuhne, kada kreketje. Lëti živi u gèrmlju i na dèrvetju ili na polju, a samo kad se mrësti sadje u vodu, gdë mužak vërlo glasno kreketje. Poslë mrëstjenja vräte se na kopno, te se ovdë hrane bubami, pauci, gljistami i poljskimi puževi. Skaču bolje nego ostale žabe, jer su im noge puno dulje nego kod ostalih žabah. Hvojnik je dug $1\frac{1}{2}$ palca. Zimi zavalj se on u blato, pu tu prezimi. Kažu, da hvojnici pokazuju, kakovo će biti vrëme, pa ih s toga dërže u staklenicah, metnuv im tu nëšta vode, trave i malu lëstvicu. Ako se hvojnik u staklenici kuplje, vele, da će doskora kiša padati; ostanë li duže u vodi, mniju, da će dugo kišiti. A kad se obësi o stëni staklenice ili uzpne na lëstvice, misle, da će biti krasno vrëme. Neosëćajuć u sobi zime,

nešpava u zimsko doba. U sklenici ga hrane muhami, koje on tu vèšto hvata. Može prilično dugo i gladovati.

Hèrženica (Grasfrosch) je žutkasto- ili cèrveno-smedje boje s mèrkimi pègami. Živi gotovo u čitavoj Europi, osobito u vèrtovih. U vodu salazi rèdko. Hrani se bubami, cèrvi, puževi, gljistami i pauci, koje na kopnu traži. Ženka snese do 10.000 jajah. Kad zategne suša, vuče se pod travu, mahovinu i u druga vlažna mèšta; a kad udari kiša opet se pomoli. Što ih se pako onda više putah na tisuće, osobito mladih, iznenada pojavlja, to je dalo povod basni, da žabe dažde. Kreketje rèdko, i to samo onako kao da mèrmlja. Butići im se jedu.

Zelena žaba ili **kvakuša** (der grüne Wasserfrosch) zelenaje; a na hèrbtu ima tri žute pruge s cèrnimi pègami. Oko očijuh ima zlatan kolutić. Za mlada je smedja. Duga je 2½—3 palca. Nalazi se gotovo u svih stojećih vodah u Europi. Mrèsti u srèd lèta. Njihovi butići jedu se. Hvataju ih u mrèže ili na udice.

Krastava žaba ili **krastača** (Kröte) duga je 3—4 palca. Ozgor je cèrveno-sivé ili cèrveno-smedje, kad i kad cèrnkaste ili maslinkaste, a s doła bèlkaste boje. Na hèrbtu i na tèrbuhu je bradavičasta i kao krastava. Živi na tamnih, vlažnih mèstih, pod kamenjem a višeputah i medju živolinom (Schierling) i kaduljom (Salbei). Zimu prospava u blatu ili u rupah. Živi 30—40 godinah. Nekreketje nikada a samo u prolètje čuje se od nje neki pasjem lajanju naličan glas. Skaču

dosta slabo, te se samo polaganu kretju. Danju izlaze iz svojih rupah samo onda, ako je kišovito vrēme. Noću izilaze da si traže hrane. Jaja su im nanizana na dugo kao vezanka. Kad je ljuta, šterà kroz bradavice neki oštri smèrdljivi sok, nu taj nije ni malo otrovan. Ima ljudih, koji kažu, da može miševе, ptice itd. svojim poglèdom tako očarati, da se nemogu ni s mēsta maknuti. Isto tako kažu, da krastača kravam mlēko sisa i da im vime truje. To sve nije istina, kao ni to, da bi mogla nēkoliko godinah bez hrane živiti. Jede bube, pauke, gljiste, puževе i mlade miše, pa s toga nam je vèrle koristna. Nebi ju smēli nikada ubijati, pače englezki vèrtlari kupuju ih, i nose u vèrt, da im tamo hvataju škodljivi gmaz. U sužanjstvu su ju već imali 36 godinah.

Pipa amerikanska (Pipa) s toga je znamenita, što ima na hèrbtu nēke jamice, u koje si pomoću mužjaka metje svoja jaja, te ih ondē dotlē nosi, dok se izlegnu mladi puloglavci i dok se ovi pretvore u podpune pipe. Duga je do 8, a široka do 4 palca.

Daždenjak (Salamander, tabl. 13., sl. 8) ima dugoljasto, prilično okruglo tēlo, puno bradavicah. Rep mu je debeo i okrugao. Boje je cèrne sa žuto-cèrvenimi pēgami. Živi na kopnu u vlažnih mēstih; poslē kiše pojavlja ih se mnogo. Inače su to dosta trome životinjice. Zimi spavaju u podzemnih luknjah. Ako ih tko razljuti, puštaju iz bradavicah nēkakvu sluz. Prije su kazivali, da vatra daždenjaku neškodи. Ženka radja do 40 živih mladih, koje se preobrazuju kao i

žabe, samo što dobiju prednje noge prije nego zadnje, dočim to kod žabah upravo protivno biva. Jedu cèrve, bube, pauke i gljiste, a ima primèrah, gdje je jedan drugoga pojeo. Kod nas ima ih dosta. Nije ni malo otrovan. — U Kranjskoj ima i sasma cèrnih daždenjakah. Naš daždenjak dug je do 7 palacah; nu u Japanu ima jedna vèrst daždenjakah, koji su i 4 stope dugački.

Vodeni štur (Wassermolch) ima po strani spljošten rep za veslanje. Ozgor je cèrno-sur, s dola cèrveno-žut s cèrnimi pègami. Mužak ima po povoru (hèrbtu) kožni greben. Lèti živu po najviše u vodi, gdje se prilično hitro kretju. Zimi uvuku se kamogod u zemlju ili pod kamenje; nu mogu i u ledu prezimiti, i to bez ikakove štete. Mrèste u vodi. Duha mu je neugodna, kao od češnjaka. Znamenito je kod njih to, što im opet naraste odsèčeno udo, na pr. noga, rep, pače i oko. Nu netrèba ovdè spominjati, kako bi to okrutno i nečovèčno bilo, kad bi im tko radi kakove nespretnè šale po koje udo odrezao.

Močarila ili **čovèčka ribica** (Olm) naliči zmi-jiću. Noge su joj vèrlo kratke. Debela je $\frac{1}{2}$ palca a duga do 10 palacah. Putene je masti. Na svètlu potamni. Ima i takvih, koje su cèrnkaste boje sa žutimi pègicami. Živi gotovo u svih podzemnih vodah u Kranjskoj na pr. u Postojni. Hraní se malimi puževi i ribicami. Dosada se još nezna, kako se razplodjuje.

Hvojnik, hèrženica, zelena žaba, kra-
stača, daždenjak, štur i močarila spadaju u razred
žabnjakah. Imaju kratko i široko tĕlo, kao na pr.
žabe, ili pako dugoljasto-spruženo i repato, kao na pr.
daždenjak, štur i močarila. Znamenito je kod njih,
što u mladosti drugčije izgledaju, nego kad sasma od-
rastu. Iz sluznih jajah — mrĕsta — izlaze kao ribice, te
dišu škèrgami kao i ribe. Kasnije dobiju pluća, a škèr-
gah ponajviše nestaje. Nĕkoji dobivaju prednje (na pr.
daždenjak), a nĕkoji zadnje (na pr. žabe) noge prije.
Nĕkoji sasma izgube rep (žabe), a nĕkojim ostaje. Kad
se na pr. žabe izlegnu iz jajah, zovu se puloglavci,
mĕrmoljci ili cĕrnoglavci.

Kornjače, gušteri, zmije i žabnjaci
sačinjavaju red **vodozemacah**. Vodozemci imaju
cĕrvenu mĕrزلu kĕrv, dišu na pluća, nose
jaja, ali nesĕde na njih. Tĕlo im je ili golo (na
pr. kod žabnjakah) ili pako pokriveno ljuskami
ili štitovi. Nĕkoji od njih imaju 2 ili 4, a nĕkoji
nikakovih noguh. Vodozemacah se dosada po-
znaje do 1000 vĕrstih. Nĕkoji od njih živu sad
na kopnu, sad u vodi; pa se s toga i zovu **dvo-
živci** ili **vodozemci**.

IV. Ribe.

(*Fische.*)

I. T è r b o p e r k e.

(Bauchflosser.)

Obični šaran (der gemeine Karpfen); usta su mu malena i usne mesnate. U čeljustih ima kosti sa jakim zubima; na gornjoj čeljusti nalaze se 4 kratka bërka. Na hërbtu ima dugačku peraju, a na ovoj jaka, zubasta bodlja; zadnja peraja je kratka, a rep rašljast. Tělo mu pokrivaju velike ljuske. S gora je većinom ugasito-maslinkaste, a po bokovih žutkaste boje. Šaranah ima mnogo vèrstih. Žive u sladkih vodah. Hrane se ne samo biljem, nego i cèrvi i bubami, pače višeputah proždere veći šaran manjega. Kad i kad dug je i 4 stope a težak do 40 funtih. Prava mu je domovina južna Europa; ali već je prenešen i u sèvernu. Njegovo meso vèrlo je tečno. Najvoli stojeće ili lagano tekuće vode. Raste bërzo i lahko se razplodjuje. U Českoj ima vèrlo mnogo šaranah, jer ih tamo goje u posebnih ribnjacih. U donjem Dunavu, naime na ušću Drave, nalove ih svake godine do 10.000 centah. Nu u gornjem Dunavu neima ih mnogo. U ribnjacih hrane ih često i žitom, graškom, pače i ovčijim djubretom. Zimi zavuku se šarani u blato, te u njem prezimuju. Měseca svibnja mrěste se potraživ u tu svèrhu mirna města. Najvole metati svoje ikre na travu i vodeno bilje.

Šaran živi 12—15 godinah; nu vele, da može živiti i 150—200 godinah, ali onda da sasma poblēdi. — Šarani su prilično čvērsta života, budući mogu dosta dugo bez vode živiti. Ako im metneš komad u rakiju umočena kruha u čeljusti, možeš je tada prilično daleko slati, samo trēba da su dobro zamotani u vlažnu mahovinu ili mokro rubje. A tko je želi dobro utoviti, neka ih zamota u vlažnu mahovinu, metne u mrēžu, i hrani u podrumu kruhom, kiselim mlēkom, žitom i salat-
tom (ločikom).

Zlatni šaran (Goldfisch) je u mladosti cērnkast, a poslē zlatne ili srebrne boje. Veličina mu dosegne najviše 12—13 palacah. Prava mu je domovina Kitaj, odakle su ga k nam donēli. Kod nas hrane ga u sklenicah, nu često i u ribnjacih. U sklenicah mora mu se lēti svaki dan, a zimi barem dva put u tjednu voda mēnjati. Velika buka ili komešanje sa sklenicom ubija ga. Inače je okretan, te se može tako pripitomiti, da u odredjeno vrēme već čeka, da mu kruha dadu. Jede muhe i cērve a osobito rado hostije; ali tih valja mu u vodu samo toliko bacati, koliko ih može pojesti, jer se voda inače pokvari. U staklenici neži-
vi duže od godine danah. Meso mu je baš izvērstno.

Karas (die Karausche) živi po svih naših rēkah. Mēseca travnja i svibnja mrēsti se. Kod jedne ženke nadjeno je već i do 100.000 ikarah. Meso mu je vērlo tečno, te neškodi baš ni bolestnim ljudem.

Kērkuša (Gründling, tabl. 16., sl. 2) duga 6—8 palacah. Živi gotovo u svih rēkah, i to hērpimice. U

jeseni mogu ih ribari množinu naločiti. Zimi se sakriju medju kamenjem; lèti pako dèrže se obalah, ali uvèk na dnu, gdè u pèsku ruje. Hrane se cèrvi, ikrom i vodenimi bubami. Meso im je bèlo i tèčno.

Linjak (die gemeine Schleie) slièan je šaranu, samo što ima dva bèrka. Pokrit je tanahnom ljuskom. Hèrbat mu je tamno-zelen, a tèrbuh žutkast. Peraje su boje ljubièaste. Bokuh je žutih u zlato se izlèvajucih. Dug je 1—1½ stope. Važe najviše 3 funta. Živi gotovo u svih stojećih vodah, rèdko kad u tekućih. Zimi zakopa se u blato. U ženke nadje se do 300.000 ikarah. Lèti se rado sunèa, pa s toga dolazi na povèršinu vode. Kad se uhvate, čuti je nekakov glas od njih. Jedu cèrve, bilje i t. d. Života su inaèe tvèrda. Meso im je dosta tèčno. Som i šèuka neèe da ih jedu.

Bèlica (Weissfisch) živi u naših rèkah. Hèrbtene peraje su kratke i maslinasto-zelene boje. Hèrbat joj je zelenkast, a strane i tèrbuh srebèrnasti. Duga je 5—6 palacah. Ima je gotovo u svih europejskih rèkah i jezerih. Love je ponajviše zimi pod ledom, ili pako mèseca svibnja i lipnja. Meso im baš mnogo nevalja, jer je puno koštrikah. Iz njezine ljuske pravi se tako zvani jalan biser (Wachspèrle), koji je prilièno slièan pravomu biseru.

Losos (Lachs), ima zubih u èeljutih, na jeziku i na nebcu. Èeljusti su mu velike. Tèla je duguljasta, valjkasta i pègava. Na hèrbtu ima dvè peraje; od kojih stoji pèrva, prava nad tèrbušnom a druga, manja, nad stražnjom perajom. Mužak je s gorà tamno-zelene, a

ženka modrikaste boje. Tělo mu je pokrito malenom ljuskom. Dužina njegova je 4—5 stopah a težina 25—30, pače i do 60 funtih. Živi u sěvernom moru; s prolětja dolazi u sve rěke, koje teku u ovo more. Plivaju u jatih, uvěk 30—40 zajedno; preskaču brane i manje slapove, i to, kao što se kaže, uhvativ se zubi za rep, prutja se uz vedu. Ovako dolazi napokon u bistre gorske potoke, koji su još prilično duboki; tu se mrěsti pa onda vrati u more. Svake godine dolazi poput laste na isto mrěstište; losići idu druge godine u more, a u vrěme mrěšnje vratjaju se u svoje rodno město. Losos je ružičasta mesa; ljudi ga děrze za najtečniju ribu. Suho njegovo meso dolazi u těrgovinu. Da se uzděrži lov na losose u kojoj rěci, trěba u gorskih potocih lososiće čuvati i štediti. — U rěci Edenu uhvatali su někoč za 72 dana 882.000 velikih lososah. Odatle se vidi, da se trud lovcu dobro naplatjuje. U naših rěkah ga nema. Losos se hrani cěrví, vodenimi bubami i manjimi ribami.

Pastěra ili **bistranga** (Bachforelle) po obliku sasvim je nalik lososu. Hěrbat joj je zelenkast sa cěrnosmedjimi pěgicami, bokovi su pako žutkasti sa cěrvenimi modro-obrubljenimi pěgicami. Rědko su duge do 1 stope; važu obično $\frac{1}{2}$ —1 funte, nu ima ih, koje važe i 3 funte. Meso im je tečnije nego ikoje druge ribe. Najvoli bistre gorske potoke. Može se děržati i u ribnjacih. Mrěste se měseca rujna i listopada. Ako živu u hladnih potocih, netreba im se bojati drugih grabežljivih ribah. Nu ima priměrah, gdě je jedna bistranga drugu pojela.

Vèrlo su živahne i okretne, te skaču višeput 5—6 stopah visoko, da koju muhu ulove. Jedu bube i manje ribe. U nekojih stranah razplodjuju bistrange umètnim izleganjem ikre u hladnu potoku. Meso se njihovo kuha, pa s ootom i uljem jede; nu mogu se i izpeći.

Cèrveni losos (Sälbling tabl. 16. sl. 6.), velik je kao bistranga, kojoj je po obliku sasna nalik, samo što je s gora smedje, sa strane běle a s dola zlatno-žute boje; živi u štajerskih, tirolskih i švajcarskih jezerih. Meso mu je tečno.

Sled (Häring) duga je do 12 palacah. Těla je dugoljasta i stisnuta, pokrivena je dosta velikimi ljuskami, koje lahko odpadu. S gora je cèrnkasto-modra, prama dolnjoj strani pako srebèrnasta. Zubi su joj u gornjoj, dolnjoj i srednjoj čeljusti vèrlo maleni. Hèrbtena peraja stoji iznad tèrbušne. Živi u sèvernih evropejskih morih. Zimi bave se na dnu mora, a prolètjem doplivaju na povèršje, da hranu traže. Sledi spadaju medju najdruštvenije životinje. Prolètjem kad se mrěste, dolaze u nebrojenih jatih u druga evropejska mora. Nu neidu uvek jednim te istim putem, jer se više putah pojave ondě, gđe ih nikad prije nije bilo. Ribari bi dakle vèrlo težko saznali za nje, da se sami neizdaju. Za krasnih vedrih naime danah izadju gotovo na povèršinu vode i to u tolikom broju, da se sve na okolo sjaje kao od dragoga kamenja i tim ih je lasno upoznati. U ružno pako vrěme izdaju se opet tim, što je voda nad njimi vèrlo mutna. A tomu je uzrok, što sledi, rekao bi, jedna

na drugoj plivaju, pa im se ljuske odlome i tim vođu pomute. Osim toga izdaju ih i mnoge ptice, koje neprestano nad njimi lete, hvatajuć ih po svojoj volji. Noću plivaju na hërbtu, a onda im se tërбуh tako sjaje, kao da je cëlo more nad njimi razsvëtljeno. Mrëste se, gđë nije od više duboko, blizu obalah i otokah. Jedna sled ima u sebi do 70.000 jajah; s toga nije ni čudo, što ih uvëk toliko imade, premda ih ljudi svake godine najmanje do 1.000 milijunah ulove. Kadšto pliva ih toliko zajedno, da prëće i istim brodovom, koji bi imali kroz nje prolaziti. Lovom sledih bave se Francezi, Englezi, Rusi, Prusi, Holandezi, Švedi, Amerikanci i svi stanovnici na sëvernih otocih. Sami Englezi šalju svake godine do 1200 brodovah u sëverno more, da slede love. Holandezi hvataju ih u mreže 500 — 600 hvatih dugačke, u kojih mora da su tako velike škulje, da se njimi mogu provući sve mlade sledi.

Sled spada medju ribe grabežljive; hrani bo se ikrami, cërvi i manjimi rakovicami. — Kad čovëk hoće da ih hvata, primami ih svëtlom na shodno mësto. Sled bez vode hitro pogine, pa bi se bërzo i pokvarila. Stoga odmah, kad ih ulove, na brodu ih osnaže i nasole. Najprije operu je u čistoj vodi, pa onda metnu u vodu, u kojoj su razpustili toliko soli, da može u njoj jaje plivati. U toj vodi ostave ih 12 — 15 satih, pa ih izvade i metnu u bačve, i tu opet dobro nasole. Brod njimi dobro natovaren hitri kući, gđë se sledi opet metju u nasoljenu vodu, pa se onda razrede i u pojedine bačve sprave, koje se mogu tada u tërgovinu slati.

Osim nasoljenih ima i sušenih sledih, koje se suše u posebnih pećih kroz 14 danah. U takvoj peći suši ih se obično 12.000. Najbolje nasoljene i sušene sledi dolaze iz Holandezke. Grenlandezi i drugi siromašni stanovnici na obalah sèvernoga mora metju sledi na pećine pa ih tako suše na zraku. Te osušene sledi služe im u zimsko doba mjesto svagdanjèga kruha.

U novije vrème rabi se sledino ulje za razsvjetljenje, jer bolje gori nego ikoje drugo. U početku pravili su to ulje samo iz odpadakah sledinih; nu sad ga prave iz cèlih sledih, ostanke pako rabe kao izvèrstno djubre.

Sèrdeljica (Sardine) na pò je velika kao sled. Hèrbta je modra, ostalo tèlo je srebèrnaste boje. Domovina njena je sredozemno more; ali živi i na englezkih obalah. Love ju takodjer na španjolskih, englezkih, francezkih, sardinskih i korsikanskih obalah. Nalaze se u ogromnih hèrpah. Love ih u velike mreže, zatim ih ponajprije nasole, a kad se brodovi kući vrate, osnaže ih, opet nasole i u male bačvice slože, ili je maslinovim uljem začinjaju i daleko u svèt šalju. Najbolje sèrdeljice dolaze iz grada Nantesa u Francezkoj. Osim sèrdeljicah love se u sredozemnom moru i tako zvane **sèrdelje** (Sardellen), koje nisu tako tečne kao prave sèrdeljice. Prije nego što se sèrdelje nasole, odrežu im glave, koje su nešto gorke. Godine 1846. ulovljeno je 121.830 centih sèrdeljah.

Štuka (der Hecht) ima široku plosnatu gubicu, mnogo oštih a na nebu velikih zubih; dolnja je čeljust promoljena; hèrbtena je peraja malena, te stoji viš zadnje Ljuske su sitne, zelenkasto-sive sa žutkastimi pègicama.

Mlada je štika prilično zelena. Velika je do 3 stope i važe 24—30 funtih; nu ima ih, koje su 6—9 stopah duge, i 30—40 funtih težke. Života je tvrda, nu raste vrlo hitro. Živi u ribnjacih, rekah i jezerih, pače i u hvalinskom moru. Rado se bavi u dubokih mjestih uz obale pod gèrmljem. Više putah dodje i do same površine, te stoji nepomično na mjestu; nu pokaže li se šta sumnjiva, eto ti je brže pod vodom. Vrlo je proždèrljiva; ona je medju ribami ono, što je tigar i vuk medju sisavoi. Grabi ne samo manje, nego i tako velike ribe kao što je sama. Lovi i patke, mlade guske, parcove, žabe i zmije. U njezinom želudcu našli su pače već i mlade pse, mačke i komade od mèrtvacah. Iz svega se vidi, da je štika radi svoje proždèrljivosti u ribnjacih vrlo štetna; ona je već mnogi ribnjak ribah sasma rěšila. Linjke nejede. — Mrěste se od mēseca veljače tja do travnja; za toga vrēmena su kao slēpe, s toga ih je moći tako rekuć rukama hvatati. U 8 funtih teškoj štuki nadje se do 150.000 jajah. Meso joj je vrlo tečno. U sēvernih krajevih suše ju nasoljenu i u tērgovinu šalju. Od njezinih ikarah pravi se hajvar (Caviar). — Pripovēda se, kako se može štika tako pripitomiti, da sama dodje na povrēšje vode po hranu, kad se zazvoni ili kad ju poznati joj glas pozove. Karlo IX., kralj francezki, imao je u svom ribnjaku u Parizu tako pitomu štku, da je odmah doplivala, čim je tko poviknuo: Lupule, lupule! — Kosti u njezinoj glavi kažu, da naliče onim spravam i svemu onomu oružju, kakovim su Isusa mučili i na križ pribijali. — Love ju na udicu, u mreže ili pucaju na nju.

Poletuša (Flugfisch) peraje na grudih vèrlo su duge, a glava s gora i sa strane plosnata; boje je modre, prema dolnjoj strani srebèrnaste; njezine peraje vèrlo su dugačke i široke. — Nalazi se u sredozemnom i jadranskom moru, a rëdko kad u velikom oceanu. Svojimi dugačkimi perajami može se preko 10 stopah iznad mora dignuti i 200—300 stopah daleko poletëti. Meso njeno vèrlo je tečno.

Som (Wels, tabl. 16, sl. 4.) ima plosnatu glavu, vrat više debeo nego širok; prema repu je plosnatiji. Ždrëlo njegovo je veliko i široko. U gornjoj ÷eljusti ima dva dugačka mesnata, a u dolnjoj 4 manja bërka. To je ponajveća riba u evropejskih rëkah. Ima 4—5, paçe i 12 dugih i 1—3 cente težkih somovah. Tolika mu je sila, da može i malu ladju prehititi. Godine 1700. proždre je u rëci Visli som nëko dëte; ali su ga tada ipak sretno ubili. Pliva lagano; boravi ponajviše na dnu dubokih rëkah i vrëba ondë na plën. Jede ribe, guske, patke, paçe i mërtvace. Kažu, da som neçe šaranah, pa ga zato višeput smëste i u ribnjacih. Noću dolazi na povëršje vođe, nu ranim jutrom vratja se natrag. Ikarah neima toliko kao druge ribe. U 3 funta težkom somu našli su ih jedva 17.000. Mrësti se mëseca svibnja i lipnja, a već za 8 danah izlegnu se mladi. Mladi somiçi slični su puloglavcem.—Hvataju ga na udicu i bodvami. Tvërd je od smërti. Meso mu je bëlo i sočno; nu težko se probavlja; a ono velikih somovah nemože se gotovo ni jesti. Troši se pečeno ili kuhano. U Ugarskoj ga suše na zraku. Iz mëhura njegova pravi se izvërstno kelje. Kadšto porodi

se kuga medju somovi, a tada pogine ih na stotine. — Kožu od soma rabe Tataři město stakla.

Som-děrhtavac (Zitterwels) sliĉan je obiĉnomu somu. Źivi u řeci Nilu i Senegalu. Ima u sebi munjine, kojom moŹe priliĉno udariti. Meso mu jedu, premda mnogo nevalja. Velik je 1—1½ stope.

Obiĉna jesetra (der gemeine Stör) ima věrljikasto i vretenasto tělo. DuŹ těla proteŹu se u pet redovah krupni tvěrdi Źtitovi. Dug je do 7—8, paĉe i do 20 stopah, a vaŹe 100—600 funtih. U Vltavi u Āeskoj uhvatili su jednoĉ jesetru, 18 stopah dugu. Jesetra Źivi u svih sěvernih morih, naime u baltiĉkom i sěvernom moru, uz francezke i englezke obale itd. Dolaze u sve řeke, koje se izlěvaju u spomenuta mora. Ima ih i u srědozemnom i u ĉěrnem moru. Jede ribe i ĉěrve, koje svojom gubicom u blatu věŹto traŹi. Love ih u velike mrŹe, a uhvatjena jednom jesetra ponaŹa se priliĉno mirno, premda kad i kad tako jako udara svojim repom, te se je věĉ dogodilo, da je neopreznim ljudim, kad ju htědoŹe izvaditi iz mrŹe, nogu prelomila. U sěvernoj Aziji love ih zimi pod ledom. Meso njihovo věrlo je teĉno. Lěti nasole ju obiĉno i suŹe, jer se nemoŹe friŹka slati u těrgovinu. Osobito u Ruskoj těrguje se ovimi ribami na veliko; jer ih tu pohvataju na godinu do 4 milijuna komadah te samoga kaviara do 800.000 funtih prodaju. Od jedne velike jesetre dobije se i 100 funtih kaviara. Od plivaĉega měhura pravi se najbolje lěpilo. Jedna jedincata jesetra ima preko 1½ milijuna jajah.

Moruna ili **běluga** (Hausen). naliči prijašnjoj. Boje je plavo-sive, s dola bělo-žute. Duga je 24—28 stopah a važe do 2.800 funtih. Živi u hvalinskom i černom moru i u rěkah, koje se izlěvaju u ta mora, naimе u Dunavu i Volgi. Početkom ožujka sele se iz mora u rěke, i to više putih u tolikoj množini, da i brane ruše. Věrlo su prožděrljive. Jedu ribe, morske ptice, tulnjeve itd. Jedna jedincata moruna ima 3 milijuna jajah, od kojih se pravi najbolji hajvar. U Dunavu love ju ostvinami, bodvami ili ju natěraju mrěžami na plitko město, s kojega nemože poběći. U Volgi pako zabiju na onih městih, gdě znadu da ima bělugah, kolje u zemlju i to tako, da se krozanj može moruna lahko provući. Prevarena riba pliva sve to dalje, dok dodje konačno na město, odkuda nemože nikuda i nikamo. — Zimi love ju pod ledom željeznimi ostvinami. Svěže meso bělugah tako je tečno kao teletina; ostalo pako, koje se nemože frižko jošte razprodati, nasole, te ga sprave za razpošiljanje. Mast rabe město ulja i masla, pa je veoma tečna. Iz ikarah pravi se, kako već rekosmo, hajvar. Jedna moruna daje često do 8 centih ikarah. Ove treba dotle šibom mlatiti, dok nestane one kožice, koja ih pokriva; zatim se dobro nasole i u bačvice sprave, pa tako u těrgovinu šalju. Najbolji hajvar dobiva se iz Ruske. Od měhura prave najbolje lěpilo ili svitke (Hausenblase). U Volgi nalove svake godine do 100.000 bělugah.

Kečiga (Sterlet) ima věrlo ostru gubicu i samo 3 reda štitacah. S gora je siva, s dola bělkasta sa červenkastimi pěgami. Dužina njena iznosi do 2, gděšto i 4

stope. Važe 15—20 funtih. Živi u hvalinskom, cèrnom i sévernom moru. Dolazi u Dunav i u ruske rëke. Meso njeno je bëllo i vërlo tečno. Od ikarah pravi se najbolji hajvar. Ovo je vërlo skupa riba; u Petrogradu bo plaćaju za nju 50—70 forintah.

Kučak ili **ajkula** (Menschenhai tabl. 15, sl. 6) je dugačka, valjkasta tëlja. U ustijuh ima sgora 6, s dola 4 niza trosèrhih velikih zubih, koje može dignuti i položiti. Boje je pepeljaste. Kadšto je dug do 30 stopah a 10 i više stopah debeo; važe preko 1.500 funtih. Njuh njegov vërlo je oštar, a najvoli jesti ono, što prije čvèrsto omiriši. Tako pripovëdaju, da mu bolje idu u tek cèrnci, nego bëllo ljudi, jer izparivanje tih posljednjih prilično zaudara. Zato će prije pograbit kupajućega se cèrnca nego bëllo čovëka. Živi u svih velikih morih, gdë ide za brodovi i ždere sve, što se s broda u vodu baca. Inače je to vërlo proždèrljiva riba. Čeljusti su mu tolike, da može zahvatiti i proždrëti cëlja cëlcasta čovëka. Gdë se god on pojavi, sve strepi od straha. Zubi su mu tako oštri, da može sva uda i kosti na jedan put slomiti. Neboji se ničesa, pače ni gruvanja topovah. Tako pripovëda Englez Douglass, da je kod nêke bitke morske, gdë su topovi strašno gruvali, skočilo nêkoliko mornarah u vodu, da se spase od neprijateljskih brodovah. Nu loša im sreća posluži, jer ih progutnu ajkule ili kućci, koji su za brodovi stajali. Još se koješta pripovëda o ajkulah. Tako kazuje nêki morski kapetan slëdeći, gotovo nevërojatni dogadjaj: Godine 1758. padne nêki mornar u vodu, i u taj par uhvati ga i proždre kućak. Nu kapetan neokle-

vaše, već on opali top na ajkulu pa je tako vješto nišanio, da je nije razbio, nego samo tako ošinuo, da je živa još i sasma zdrava mornara izbacila, kojega su dakako drugovi odmah iz vode izvukli. — Kučak ždere ribe, tulnjeve i druge morske životinje. Iz njegova tuča i jetarah dobiva se riblja mast, a iz kože pravi se drapavica (Chagrin). — Koncem ljeta radja ženka po 3—4 žive mlade, i to nekoliko putih, dok ih nepolegne 30—40 komadah. Mladi kučak dug je 6—8 palacah.

Najveći mu je neprijatelj vèrvanj. O borbah ajkule s vèrvnjem vele da su strašne. Meso ajkulino jedu u nekih zemljah, i to naime na otoku Islandu, u Guinei i drugdè. Jezik njen dèrže cèrcnci za osobitu poslasticu.

Morska mačka (Hunds- ili Katzenhai) duga je samo 2—3 stope. Boja je njena cèrvenkasta sa mnogo smedjih pègah; a ozdol lèpo bèla. Živi gotovo u svih morih vrućega i umèrenoga pojasa. Vèrlo je proždèrljiva, te čini ribarom mnogo štete, jer ne samo da proganja druge ribe, nego im, ako se sama u mrèžu ulovi, istu pregrize. Tvèrda je od smèrti. Meso joj je žilavo i tvèrdo, s toga jede se tek u najvećoj nuždi. Koža joj dolazi u tègovini pod imenom ribje kože; tokari služe se njom mèsto pilaka (Feile).

Jaram (Hammerfisch ili Hammerhai, tabl. 15. sl. 8.), ima glavu sa svake strane kao jaram produženu. Oči su mu cèrne sa zlatnima kolutići; njimi može dolè i na stranu bacati. Boje je ozgor tamno-sive, a s dola bèlkaste. Koža mu je hrapava. Naraste 6—12 stopah dugačak a yaže 4—5 centih. Ima ga i u sredo-

zemnom moru. Strašno je proždèrljiv, te napada i ljude. Ženka radja 10—12 mladih. Meso mu je tvrdo i žilavo, ali se ipak jede, jer mornari misle, da čovèka krèpi. Iz jetrah dobiva se mnogo ulja; iz kože pravi se drapavica. Od jaramah poznato je do sada 5 vèrstih.

Pilan (Sägefisch) ima gubac poput ravnoga mača koji mu je s obè oštre strane zubi tako posut kao pila, pa odatle mu i ime. — Dug je 12—15 stopah. Ima ga u svih morih. Pilan je inače i zloban, pa i tim pogibeljniji, što ima tako oštro orudje, da može drugim životinjam lahko tèrbuh razporiti. Strašna li prizora, kada se zametne borba medju pilanom i kitom; nu pilan nepopušća prije, dok kitu nerazpori tèrbuh, ili dok mu ovaj neprelomi njegovo oštro oružje. Pilani se i medju sobom bore i to strašnom bèsnoću. U toj svojoj razjarenosti udara pilan i na same brodove, tè se često dogadja, da tako čvèrsto pilu zasèče u brod, da ju više nemože izpuknuti, dok je neprelomi. Meso mu je tvrdo; nu afrikanski cèrnaci jedu ga ipak. Pilan radja žive mlade, koji imaju na tèrbuhu nèki mèhur, iz kojega im tèlo dobiva dotle hranu, dok si mogu sami drugu pribavljati. Hrani se manjim ribami i morskim biljem, koje, kako vele, svojom pilom sèče. —

Osim ove vèrsti ima još i drugih manjih pilanah.

Tèrnaka ili **dèrhtulja** (Zitterroche) ima okrugljasto pljosnato tèlo, kratak mesnat rep sa 2 hèrbtene peraje i jednom repnom. Koža mu je gladka, jetrenasta, bèlo- i suro-pègava. Na gornjoj strani nalaze joj se

oči, a na dolnjoj usta i skèržni otvori. Obično je duga 1—2 stope. U glavi ima munjevnu spravu, kojom žestoke daje udarce; te njom može ubiti i male životinje. Leži obično na dnu mora, a samo kad se mrèsti, dodje na površje. Meso se jede. Živi ne samo u sredozemnom, nego i u drugih morih.

Žutuga (Stechroche) je okrugla i gladka tēla. Rep ima tanak i dugačak. Repnih neima perajah. S traga ima zubat, 4 palca dugačak žalak, kojim žestoko ubada. Usta i skèržni otvori nalaze se s dola. Dug je 1—1½ stope, a važe do 10 funtih. Ima ih manjih i većih, lagljih i težih. Zube ima tako oštre i pogibeljne, da su ih prije smatrali za otrovne. Stari Gèrci i Rimljani opisivahu ih strašno, kazujuć, da mora svatko umrèti, koga žutuga ubode. Tako pripovēda neki rimski pisac o nekome tatu, koji je htēo žutugu ukrasti; nu ova ga tako ubode, da se je odmah mèrtav srušio. Pače Rimljani su tvèrdili, da mora svako stablo usahnuti, koje bi ovim žalcom uboli. Japanci pako nose ovaj žalak sa sobom, misleć, da im neće naoružanim takovim štitom otrovna zmija našuditi. Amerikanci ga rabe kao strēlu, koja je tim ubitačnija, što se daje radi svojih oštirih zubih težko izvući iz rane. Ovaj žalak tako je oštar, da može i kroz čizme prodrèti i težko raniti. Ima je u svih evropejskih i drugih morih. Meso joj je žilavo i netečno; jetra pako vèrlo tečna; od njih pravi se ulje.

Barakula (Glattroche) slična je prijašnjoj. Boju ima oèrno-smedju, s dola žutkasto-bēlu. Živi u sēver-

nom i srēdozemnom moru. Obično je 1½ stope široka i 3—4 palca debela; nu ima ih, koje su 4—6 stopah široke, 1 stopu debele i do 200 funtih težke. Meso joj je osobito u prolētju vērlo tečno; jede se ili frižko s maslacom ili goru-čicom, ili pako na zraku sušeno, a ovakovo šalje se i u tērgovinu. Islandjani ga pripravljaју kao bakalar, te prave iz njezinih jetrah bělo ulje.

Sve dosada opisane ribe spadaju medju **tērboperke**. Imaju dvā para plivaćih perajah, jedan par s preda, na svakoj strani pērsiuh po jednu, drugi par s traga na tērbuhu; hērbtene i zadnje peraje imaju gotovo uvēk član-kovite zrake.

III. Gērloperke.

(Kehlflosser.)

Treska ili **bakalar** (Kabeljau ili Stockfisch) je dugoljasta debela tēla, koje je pokrito malimi ljuskami. Boja njegova je žuto - siva i smedje - pēgasta. Živi u sēvernom oceanu, a ima ga uz gdēkoje obale, na pr. uz Norvežke, Islandske, sēverno Amerikanske itd. u neizmērnoj množini. Dug je 2—5 stopah, 1 stopu debeo i 12—50 funtih težak. Ima 3 hērbtene i dvē zadnje peraje. O bradi visi mu bērk. Usta su mu znatno velika. Hrani se cērvi, raci i manjjimi ribami, a najvoli sledi. Vērlo je proždērljiv, najviše pako kad se izmrēsti. Love se obično samo udicama; mrēžami nehvataју ga sada, jer se tim kvvari posao, budući se u mreže ulove i onakovi, koji se

nisu još mrěstili. Mrěsti se u zimi. Jedna jedincata treska ima u sebi do 10 milijunah jajah!! Pravi lov na treske traje na norveških i islandskih obalah od veljače do ožujka, a na američanskih od svibnja do lipnja. Lovom tresakah bavi se u Europi do 50.000 ljudi. Kao namamu na treske metju na udice čèrnokèrvku (Tintenfisch) a u nuždi i čèrvene kèrpice. Jedna ladja, koja umie dobro taj posao, može ih na dan uloviti 400—600 komadah. U prijašnje doba lovili su ih najviše na islandskih i norveških obalah; nu sada najviše na obalah otoka Nevfundlanda, gdje ih se svake godine nalovi do 2 milijuna centih; ulja odavle dobiju do 2.000 bačavah, što vrědi preko 3 milijuna forintih. Stanovnikom ovoga otoka je lov na treske glavnim zanimanjem i poslom, a njim se bave već od 16. stolětja. Francezi, Englezi i Amerikanci šalju najviše bakalarah u tèrgovinu; nu najbolji dolaza ipak od Holandezah i Norvežanah. Za stanovnike sěvernih krajevah je lov na treske pravi blagoslov božji; on je njim ono, što Laponcu gojitba sobovah. Meso mu jedu, kosti trěbaju za ogrěv, koje moraju prije smočiti u ribje ulje, kožom hrane pse, koštrikami krave i ovce, iz mēhura prave ribje kelje. — Od treskinih jetrah prave jetreno ulje, što ga osobito u novije vrěme trěbaju kao lěk. Nasoljene ikre njene šalju se u Norvežku, Francezku i Španjolsku, gdje ih rabe kao namamu za sěrdeljice. Kako već gori rekosmo, ima u jednoj treski do 10 milijunah ikarah, s toga lahko je dokučiti, kako se treske razplodjuju. Da neimaju toliko neprijateljah, doskora bi im pretěsan bio prostor u neizměrnim moru.

Najveći joj je neprijatelj kit, koji treba tako rekuć za zajutrak do 600 tresakah; u njegovu želudcu našli su ih već i živih.

Obični tovar (der gemeine Schellfisch), po hêrbtu, je smedje po têrbuhu srebêrnaste a na stranah cêrne boje. Za pèrsnimi perajami ima cêrnkastu ljagu. Dug je 1—3 stope; važe 13—14 funtih. Živi u sêvernom, rêdko u iztočnom moru. Na holandezkih, grenlandezkih i englezkih obalah nadje se više putih u tolikoj množini, da ga prodavaju za vêro malene novce. Od studenoga do sêčnja ima ih tamo najviše. Hrane se ribami, a najviše sledi, od kojih u lèti veoma odebljaju. Meso im je bêlo i tečno, a želudac ga lahko probavi. U sêvernom moru love ga udicami, i to tako, da ih se više priveže na uže i u vodu spusti.

Kalar (Dorsch), s gora je sivo-smedje, a s dola bêle boje. Dug je 1 stopu. Živi u iztočnom i bêlom moru, a u obće na obalah sêverne Europe. Dolazi i u ustja rêkah. Meso mu je tečno, te se jede svêže i nasoljeno. Zimi love ih osobito mnogo, pa tako ulovljene slože na morskoj obali, i puste ih da se smêrznu; zatim odpreme je u Rusku. Grenlandezi hvataju ih posebnim naćinom. Izkopaju naime u ledu škulje i metnu u nje kao vabilo olovljene ribice. Gladni kalari dodju, pa se tako ulove. Obićni lov traje u Švedskoj od svibnja do kolovoza.

Iver ili **veliki rubac** (der Steinbutt), dug je 3—6 stopah a težak 20—30 funtih. Têlo mu je pljosnato i nepravilno, a glava tako zakrenuta, da su oba oka na jednoj strani. Pliva boćimice. Gornja strana têla posuta

je malenimi i okruglimi košticami. Živi u sèvernom i srèdozemnom moru. Na englezkih obalah ima ih vèrlo mnogo; u samom Londonu prodade ih se na godinu do 300 centih. Meso mu je tèčno; a nasoljeno i papreno šalje se u tèrgovinu.

Manjak (die Quappe ili Aalraupe), ima sitne i u kožu utisnute ljuske tako, da se čini tèlo rupičasto, inače je valjkasta i sluzasta tèla. Živi gotovo u svih sladkih vodah evropejskih. Kad hoće jesti, sakrije se u mulju, čekajući dok se približi koja manja ribica, da ju pojede. Hrani se i ribjom ikrom. Štuka i som najveći su mu neprijatelji. Mrèsti se mēseca prosinca i sēčnja. U jedne ženke ima do 120.000 jajah. Obično je vèrlo tust. Velik je navadno do 1½ stope; nu nadjeno je već i takovih, koji su bili 5 stopah dugački, a 12 funtih težki. Meso mu je veoma tèčno, a osobito njegova bēlkasta jetra.

Tun (der Thunfisch, tabl. 16., sl. 8), ima s gora modrastu a srebèrnastu boju. Hèrbtene peraje stoje jèdna do druge. Obično je 6 stopah dug a 5 centih težak; nu ima i takvih, koji su dugački 18 stopah a važu 15—18 centih. Vèrlo je okretan; opaziv svoj plēn otisne se za njim tolikom hitrinom, da ga nije moguće okom pratit. Najvoli sèrdelje, kojih mnogo pojede. Živi u svih evropejskih morih a najviše pako u sredozemnom, gdē dolaze u hèrpah na tisuće. Meso mu je vèrlo tèčno, a dok je svēže, naliči mesu sisavacah. Dok je frižko, vèrlo je zdravo; nu pokvareno strašno škodi. Pokvarena tunina pozna se po tom, da su joj koštrike cèrvene, i što se tako reži kao da je paprena. Lov na tunove vèrlo je

važan za nekoje zemlje, osobito za Sardiniju i Siciliju; nu love ih i u hèrvatskom Primorju i u Dalmaciji. Koliko se nemože frižkih prodati, ono nasole, metnu u ulje, i šalju u tèrgovinu.

Skušà obična (gemeine Makrele), boje je srebèrnaste, po hèrbtu modraste s cèrnkastimi poprèčnicami. Ima pet nepravih perajicah s dola i s gora. Ta ribaselica nalazi se u svih zapado-sèvernih evropejskih morih. U prolètju dolazi iz ledenoga mora na obale islandske, irske i škotske, pa i u sredozemno i cèrno more i to u tolikoj množini, da je od njenih jajah voda uz obalu francezkoga kanala bëla poput sopunice. Duga je 1—2 stope. Najviše lovi ih se od svibnja do kolovoza. Meso joj je tečno, ali želudac teško ga prokuha. Lov na skuše vèrlo je važan za Francezku, Englezku i Nizozemsku.

Jaglan (Schwertfisch); njegova čeljust dugoljasta je poput mača. Dug je 10—12, pače i 20 stopah; važe 4—5 centih. Živi u sredozemnom moru, osobito uz Siciliju. Vèrlo je jak; repom udara žestoko. Svojim mačem je drugim ribam dosta pogibeljan. Kažu, da i sam kit pred njim bëži. Jede ribe, cèrve i morsku travu. Meso mladih osobito je dobro; ono starih naliči govedini. Jaglan je krasno-srebèrnaste, s gora nešto modraste boje.

Morski vuk (Seewolf, tabl. 15, sl. 10), na hèrbtu ima jednu peraju; tèrbušnih neima. Prednji zubi su mu dugački i čunjasti. Boja mu je smeđjasta s mèrkimi poprèčnicami. Morski vuk je vèrlo grabežljiva riba. Što jednom zakvači, nemože mu se nikakovom silom oteti. Ribari ga odmah ubiju, čim ga ulove, jer bi ih mogao

lahko svojimi ostrimi zubi ozléditi. U njegovu želudcu našli su već pëska i kamenja. Hrani se raci, rakovicami i ljušturami; nu jede u ostalom sve što god zahvati. Tromo se kretje, a to jo prava sreća za one životinje, kojima se hrani. Bavi se na dnu mora, a samo u prolétju dolazi na obale, da se mrësti. Njegova jaja velika su kao grašak. U dužini ima 3—4, pače i 7 stopah. Meso njegovo jedu; iz kože pravi se odëlo i obuća, a žuč rabe za sopun.

Bežmek (Sternseher, tabl. 15, sl. 9.) boje je zelenkasto — smeđe. Dug je 1 stopu. Živi u sredozemnom moru. Znamenit je s toga, što su mu oči na čelu tako namëštjene, da gleda u nebo.

Fanfara (der gemeine Pilot, tabl. 15, sl. 1.), ima na hërbtu 3, rëdko kad 4 bodljike. Boje je modraste, na hërbtu tamnije, a s dola jasnije. Tëla je valjkasta sa 5 tamno-modrastih ili ljubičastih poprečnicah. Dug je 6—12 palacah. Živi u sredozemnom moru, u oceanu, pa i u indijskom moru. Mornari dërže ga za vodju ajkula (kućakah), jer se uvek nalazi u njihovu druztvu. Pliva vërlo hitro, pa umie ajkuli vësto izmaknuti, kad joj odatle nastane pogibelj.

Gërgeč (Flussbarsch) hërbta je vërlo pogurena, a žut kao žuta mëd sa ugasito - zelenimi prugami na poprëko; zadnja repna peraja je cërvena. Živi gotovo u svih rëkah i jezerih Europe i Azije. Neroni duboko pod vodu; najvoli takva mësta, gđë ima tërške. Zimi ide nëšto dublje pod vodu. Pliva vërlo hitro. Mrësti se mëseca trav-

nja i svibnja. Ikre su tako velike kao zèrno graha. U $\frac{1}{2}$ funta težkom gèrgeču nadje se do 300.000 jajah. Kad je lèpo vrème, izlegnu se mladi za 48 satih. Dugačak je 1—2 stope; važe 3—4 funta. Meso mu je bèlo i tečno. Hèrbtene peraje tako su bodljikaste, da se čovèk može lahko na njih raniti. Iz kože njegove pravi se kelje, o kojem vele, da je bolje od bjeluginih svitakah.

Smudj (Schiel; Fogasch), s gora je zelenkastosiv, s dola bèlkast. Živi u svih naših rèkah. Tako je proždèrljiv, da neštèdi ni svojih mladih. Meso mu je vèrlo tečno, nu može se samo zimi dalje slati. Smudj pogine čim ga izvadiš iz vode. Najbolji smudjevi su u blatnom jezeru, gdè se nadje i takvih, koji važu do 30 funtih. Obično je dug 3—4 stope, a 20 funtih težak. Zimi galove pod ledom u mreže, probivši dakako prije led. U Dunavu i Tisi ima ih vèrlo mnogo, pa ih tamo na zraku suše kao tresku. Mrèsti se mèsèca travnja.

Treska, tovar, kalar, iver, manjak, tun, skuša, jaglun, morski vuk, bežmek, fanfara, gèrgeč i smudj spadaju medju **gèrloperke**. Sve 4 plivače peraje stoje im sprèda; dvè na pèrsih, sa svake strane po jedna, a dvè na gèrlu.

III. Golotèrbe.

(Kahlbäuche.)

Jegulja ili **ugor** (der Aal, tabl. 15, sl. 5.) nalik je zmiji. Kožu ima vèrlo sluzku. Jegulja je 3—4 stope

dugačka i 3—4 funta teška, nu ima ih i 6—7 stopah dugih i 20—25 funtih težkih. Živi skoro u svih rěkah; ali u Dunavu i Volgi ima ih dosta malo; nu tim više u Neretvi, u Dalmaciji. Stare jegulje sele se iz rěkah u more, da se tamo mrěste, a onda se opet vratjaju u rěke. Mladi ugori dolaze iz mora u sladke vode. Danju uvuče se jegulja u blato; isto tako i zimi. Zima, vrućina i gèrm-ljavina škode joj. Jegulja nije baš tako plaha kao druge ribe; ima priměrah, te su ju tako pripitomili, da je iz ruke jela. Hrani se drugimi manjimi ribicama, žabami, raci, bubami i t. d. Ribju ikru vërlo rado jede. Pripovėdaju, da rado zoblje mladi grašak i da radi toga češće puza u grahovišta. Noćju polazi kopno dok je rosa. Tako je tvėrd od smėrti, da može i 3 dana živiti bez vode. Zamotaš li ga u travu i tėrsku i dodaš nješto vode, tad ga možeš slobodno daleko slati, neće se pokvariti. Ima priměrah, da je bez zraka i vode živio čitav sat. Mnoge kuharice opazile su već i to, da se pojedini komadi raz-sěčenoga ugora još giblju, kada već hoće da ih nasole. Pripovėdaju i to, da su rode ulovljene jegulje sa svojim trusom na zadnjicu još žive izrinule. To sve dokazuje, kako je ugor tvėrd od smėrti. Meso ugorah je tečno i tusto, ali ga želudac teško prokuha.

Gdė ih ima mnogo, suše ih ili mariniraju. Mast njihova rabi se za razsvėtu. Koža njihova služi Tatarom mėsto stakla u prozorih; iz nje prave takodjer remenje, koje je jaće nego ikoje drugo. Love ih udicama, mrėžami, vėrškami i vilicami. U ribnjacih mogu jegulje dobro rasti, ali neće da se plode. U sėvernom i iztoćnom

moru love ih na veliko; isto tako i u řekah Odři, Padu i u drugih.

Ugor dërhtavac (Zitteraal) nalik je prijašnjemu. Boje je različite. Dug je 5—6 stopah i težak do 40 funtih. Živí u južno-amerikanskih ribnjacih, potocih i řekah. Bez vode nemože dugo živiti. Ljudi i životinje boje ga se radi njegovih munjevnih udaracah. Gdě ih mnoho ima, utamane sve ostale ribe. Humboldt pripověda, da je jednom stao na ovakova ugora, kad je on upravo iz vode izlazio, pa da je uslěd toga čeli dan osěćao bol u kolěnih i ostalih udih. U někojih krajevih južne Amerike lěče bolestnike ovimi munjevnimi udarci. — Koli strašno dělujú ugori - dërhtavci svojimi udarci, o tom pripověda Humboldt ovo: „U močvarnih jezerih i řekah blizu Calabiza ima mnoho ugorah dërhtavacah; ali ipak nemogosmo kući ni jednoga nabaviti, premda bi ga bili dobrò platili. Odlučismo dakle, da idemo sami u lov na nje. Bilo to upravo 19. ožujka u jutro, kad smo došli u něko selò, gdě je bilo u močvarnom potoku dosta úgorah. Budući pako je težko loviti te jegulje u mrěže, s toga nakanismo hvatati ih konji. Indijanci sakupe naime do 30 konjah i mazgah, pa ih zatěraju u močvarni potok. Nastala uslěd toga halabuka izmami jegulje iz blata, a one počmu udarati svojom munjevinom na konje i mazge. Indijanci obkoliv barež nepustiše ni jednoga konja iz močvare. Ugori udarahu sve to silnije na konje, od kojih su gděkoji tako iznemogli, da su se srušili u vodu, a drugim se od straha pred nevidljivim neprijateľem naježi griva i oči planuše vatrom. Někoji konji sretno

su pobegli, ali od slabosti nisu mogli ni hodati. Žestoka ta borba postajase konačno sve slabijom, jer su borme i jegulje oslabile neprestanim udaranjem. Sada su ih Indijanci počeli vaditi posebnimi na suhom užetu privezanimi ostvinami, i za nekoliko trenutakah imali smo ih 5 komadah. Nekoje od njih bijahu 5 stopah i 5 palacah dugačke, i krasne maslinkaste boje. Ludo bi bilo dotaknuti se ugora, koji ima u sebi još svu svoju munjevu snagu, te bi čvrsto osjetili jak njegov udarac. — Jednoć dobio sam ugora - dèrhtavca, što su ga ulovili u mrežu, te ga metnuo k želvam i žabam. Ele, kako se ove uplaše, kada poče ugor pucati! Žabe poběgoše odmah, čim su se oporavile od udaracah jeguljinih, a kad sam ih drugi put metnuo k njemu, uplaše se pogledav ga samo.“ Ovak ugor vrlo je trom, pa bi teško došao do hrane, da svojom munjevinom neubije ili neoslabi ribe, koje treba za hranu.

Okatica (Lamprete, tabl. 15., sl. 4.) neima plivaćih perajah, nego samo 2 hèrbtene; na svakoj strani 7 okruglih škèržnih rupicah; usta su joj okrugla, a koža gola. U čeljusti ima dosta oštre zube, kojima rani druge veće ribe, a onda se na nje prilèpi te im kèrv sisa. Vrlo je sluzka. Boja joj je s gora žutkasta. Biva 2—3, pače i 4 stope duga i 3—6 funtih težka. Živi u svih europejskih morih, najviše pako ima ih u iztočnom i sèvernem moru. Dolazi s prolètja i u rëke, koje teku u spomenuta mora, da se u njih mrèsti. Tako čvrsto se prilèpi, da možemo i 12 funtih težki kamen, na kojem se prikvaći, dignuti, ako samo nju dignemo. Nèki Englez pripovëda, da je jednoć vidio, kako se kamenje u vodi giblje. Uzme to

dakle opreznije motriti, pa opazi, da su se okatice o kamenje prisisale, te tako dugo svojim repom u vodi mahale, dok su kamen okrenule. Prehitiv koji kamen traže odmah cèrve i druge životinjice, koje su pod njim živile. — Meso joj je vèrlo tečno, ali i dosta skupo. Marinirano šalje se u tèrgovinu.

Piškora (Flusspricke) nalik je prijašnjoj, samo što je nešto manji. Živi u močvarnih jezerih, ribnjacih, rekah i potocih. Hrani se cèrvi, vodenimi bubami, ikrom, stèrvinom, itd. U prolétju dolaze iz ribnjakah i jezerah u rëke i potoke, da se mrèste, te ostanu ovdë tja do jeseni. Love ih u prosincu, jer im je mësò onda baš najtečnije; dočim lëti nevalja, pa i nešto neugodno vonja. Tvèrdi su od smèrti, pa mogu i nekoliko danah živiti bez vode. Jedu se ili svëži ili marinirani. Love ih u mrëže, u vërške ili na granje, koje im metju zimi u luknje na ledu, da se nanj prisisaju.

Morski konjić (Seepferdchen, tabl. 15, sl. 2.) boje je zelenkaste sa smedjimi ili cèrnimi piknjicami. Živi gotovo u svih morih, naimë u oceanu, u srëdozemnom i jadranskom moru. Dug je $\frac{1}{2}$ —1 stope. Glava mèrtva konjića naliči konjskoj glavi. Jedë manje morske životinje i ribju ikru. U Dalmaciji mu pripisuju nèku lëkovitost.

Krilas (der fliegende Drache, tabl. 16, sl. 1.) velik je 3—4 palca. Živi u istočno — indijskom moru. Premda mu izgledju grudne peraje kao krila, čini se ipak, da nemože letëti.

Butac (Stachelbauch, tabl. 15, sl. 7.) živi u srëdozemnom moru i indičkom oceanu. Dug je 1 stopu i više. Kad se napuhne tada je gotovo sasma okrugao. Po tëlù ima bodljike, kojimi može

čvèrsto raniti. Nèka vèrst butacah živi i u ustju rëke Nila; kad ju tamo dèčaci ulove, napuhnu ju, pa se njom igraju kao loptom.

Jegulje, okatice, piškori i još nèkoje druge ribe i maju samo jedan par plivačih perajah ili nijedne. Okrugle su i nalične zmiji. Zovu so **golotèrbe**.

Ribe imaju cèrvenu hladnu kèrv, dišu škèrgami, a razplodjuju se jaji, koje zovemo ikrom. Ponajviše su pokrite ljuskom ili štitci; rëdko kad su gole. Žive u vodi. Hrane se ponajviše životinjami; ima ih, koje i bilje jedu. Škèrge su namēštene s obiuh stranah glave, te su sastavljene ponajviše iz tankih, poput češlja poredanih finih listićah, koji su puni kèrvnih žilicah. Dišu vodu ustima, pa ju škèrgami van puštaju. Imaju mēhur, koji mogu zrakom napuniti ili ga izprazniti, da se u vodi dignu ili na dno spuste. Kad riba jaja nosi, kaže se, da se mrēsti. Skoro sve ribe imaju peraje (plovke ili plitve), dá mogu dobro plivati. Meso im se jede. Sada poznatih ribah ima prëko 6.000 vèrstih.

V. M e k u š c i.

(*Weichthiere.*)

I. Glavonožci.

(*Kopffüsser.*)

Hobotnica obična (der gemeine Achtfuss) ima 8 hvatalah, koja su šest put duža od tēla. Pomoću tih hvatalah hoda po tlu. Kože je bradavičaste; duga je obično 2 stope; a hvatala su joj tada 12 stopah duga. Važe više-putih do 150 funtih. Boja joj se prelēva na žuto i sivkasto. Vēro je proždērljiva, a kad svoj plēn hvatali prikvači, dērži ga tako čvērsto, da ju možeš i s njim u vis dignuti. Živi u svih evropejskih morih; najviše ih ima u srēdozemnom, osobito uz gērčku obalu, gdē je čēstje kupajućim se ljudem dosta pogibeljna, jer ih zahvati svojimi hvatali, i povuče u vodu. Meso joj je tečno. Love ju raznim načinom: tako na pr. spuste u more svežanj maslinovih grančicah, na koje je privezano olovo, tako da je svežanj teži. Hobotnica prihvati se za svežanj tako čvērsto, da ju mogu van izvući i uhvatiti. Love ju i udi-cami. Najvolji se baviti medju morskim grebeni, za koje se čvērste prilēpi. Poliješ li ju slatkom vodom, odmah padne sa grebena. Stari pripovēdali su o njoj čudnovite stvari. Tako na pr. bajahu, da morske ljuštore zatvore

svoje školjke, čim pruži hobotnica svoja hvatala, da ih izvuče iz školjkah, a tim da joj odsěku hvatala. Ali ni hobotnica nije lěna, vele oni, jer se ljušturi drugom prilikom tako osveti, da joj metne u otvorene školjke kamen, tako se ova više zatvoriti nemože, pa onda ju izvadi i pojede. Osim toga, pripovėdahu oni, da ima u indijskom moru tako velikih hobotnicah, da mogu i prilično velike tєrgovačke brodove prehititi, kad se na nje prilěpe.

Obična cєrnokєrvka (Dintenfisch*) je těla gotovo valjasta. Ima 10 hvatalah, a na njih siske, kojima se prisisa na druga tělesa. U ustijuh imá 2 tvėrde čeljusti. Bez noguh je duga 2 stope. Koža joj se šareno prelěva. S traga ima obli, tvėrdi štit, poput koritca, pun redomice naslagane pєrhke vapnenine, kojom se tєrguje. Ova vapnenina zove se sipovina, te se treba za čišćenje kovinah i za gladjenje dєrva, kosti itd. U sebi ima cєrnokєrvka mєhur pun cєrnila; kad se nadje u nevolji, izpusti i pomuti njim vodu. Ljudi suše ovo cєrnilo, jer se njim slikari služe i zovu ga sepijom. Ovo cєrnilo je gusto, sladko i cєrno-suro. Cєrnokєrvka jede ribe, rake, puževe i druge morske životinje; ali i nju jedu veće morske ribe. Siromašniji ljudi na francezkih, španjolskih, portugalskih i talijanskih obalah jedu cєrnokєrvku. Živi u svih europejskih morih.

Obična ladjica (gewöhnliches Schiffsboot) ima mnogo hvatalah, koja može po volji protegnuti i uvući. Kućicu, kao mlěko bėlu, ima na više komoricah razdė-

*) Slika se nalazi u IV. knjizi „Věnce“ na tabli 21, st. 3.

ljenu. Kućica joj se iz nutra sjaje kao biser. Masti je sure s cèrnkastimi pègicami. Nogami se služi kao cèrnokèrvka. Kada pliva, digne usta gore i noge pusti na vodu. Puza prilično hitro. Obično se dèrži na dnu mora, a samo poslē bure izadju hèrpimice na vodu. Prazne kućice, iz kojih su ribe ili rakovice životinjicu izvadile, mogu se često viditi na vodi plivajuće. Ove kućice rabe se kao čaše.— Meso njeno jede se, premda je još lošije nego cèrnokèrvke, budući je tvèrdo te ga želudac teško prokuha.

Hobotnica, cèrnokèrvka i ladjica spadaju u razred **glavonožacah**. Sve ove životinjice imaju vidljivu glavu, a na njoj dvè velike oči, lèvčasta usta, a oko njih hvatala. Razplodjuju se jaji. Živu u moru, te se hrane ribami, mekušci i drugim morskimi životinjicama. Plivaju i prilično dobro puze, a pri tom služe se svojimi hvatali mèsto noguh.

II. P u ž e v i.

(Schnecken.)

Obični balavac (gemeine Ackerschnecke) dug je 12—15 cèrtah; boje je sivkaste; tèlo mu je dugo, gotovo oblo, samo s dola nèšta pljosnato. Neima kućice. Živi u šumah, vèrtovih, na njivah i livadah. Ako se dotaknemo njegova tèla, odmah se obviije nèkim dosta gustim sluzom. Svoja jaja metje pod kamenje, lištje, u obće na vlažna mèsta. Čini velike štete, osobito onda, kada se jako umnoži. Na vèrtu kvare ločiku (salatu), zelje itd.,

a na polju grize listje mladomu usěvu. I gljive i vėrganje rado jede. Osobito u jutro i na večer jede mnogo, a kad je kišovito, jede čitav dan. Kad nastane vrućina, sakriju se. Najlaglje ih je utamaniti, kad se zubačami i metlom sakupe, ubiju i u zemlju zakopaju. Svinje, patke i guske rado ih jedu. Dobro je na večer metnuti poklopac od škatulje na vėrt, pod koji se u jutro sakriju. Običavaju takodjer pepelom ili odpadci konoplja i lana posipati ona města, kamo najčestje dolaze, jer nemogu preko pepela. Dobro je kasno pod jesen preorati polje, na kojem ima puno balavacah, jer će se oni tako smėrznuti. Kao dobro sredstvo, da se utamane balavci, preporučaju i zelenu skalicu (Eisenvitriol), koja se mora stući na prašak, sa zemljom směšati i tako po polju posipati. Za jedno jutro zemlje uzimlje se 20—30 funtih skalice. Skalica mora se samo za vlažna vremena prosipati, kad su balavci vani. Ako nije polje još nasijano, treba skalicu prije prosipati nego se žito sije, jer će drugčije balavci odgrizti zėrnju klice. Ovo srėdstvo tako je izvėrstno, da moraju s njega svi balavci odmah poginuti. Dr. Sprengel veli, da ga je upotrebio na jednom polju, gdje je bilo na četvornoj stopi do 20 balavacah, a za nekoliko danah svi su poginuli. Isti gospodin preporuča još i slėdeće srėdstvo: Gdė ima u blizini pivarah, može se u brazde medju slogovi i na staze medju gredicama nastėrti slama iz komovnjaka (Maischbottig), u kojoj ima još dosta sladovine. Ovo neka se učini oko zapada sunca. Noćju sakupe se svi balavci u tu slamu, pa ih možeš na tisuće uništiti. Ovo valja učiniti nekoliko putih zasebice, pa će

nestati svih balavacah. Netreba ni spominjati, da valja složnimi silami tamaniti balavce, to jest, da svi susēdi najedan put shodna srēdstva upotrēbe, jer ništa nekoristi, ako samo jedan gospodar o tom nastoji.

Balavac veliki (die grösste Ackerschnecke) razne je boje. Obično je cerno-pēgast ili prugast. Ima ih i cernkastih. Dug je 4—5½ palca. Živi u gērmlju, vērtovih i šumah; a čini dosta štete. Svako dēte poznaje ga vērlo dobro.

Jedatan puž (Weinbergsschnecke) ima žuto-sivu, gotovo krugljastu spužnicu. Živi u srēdnjoj Europi; on je najveći medju svimi puževi na kopnu. Bavi se na hladovitih mēstih, u šumah, vērtovih i vinogradih. Pod večer izilazi, da hranu traži; to isto čini kad je kišovito vrēme. Hrani se sočnim biljem. Lēti snese 50—100 gotovo kao grašak velikih jajah, i to u 3—4 kupa, koje zakopa posebice na vlažnih mēstih u zemlju. Ta jaja pokrita su kožnatom ljuskom. Za 21—45 danah izlegnu se mladi, koji se hrane najnježnijim biljem. Puž stanuje uvēk u jednoj spužnici, koja š njim raste. Prema zimi zatvori otvor svoje spužnice vapnenom opnicom, da se obrani od zime. Tada kupe puževe te ih razno pripravljene jedu. Na nēkih mēstih goje ih u posebnih pužnjacih (Schnecken-garten). Tove ih namočenimi pšeničnimi posijami. Puž je vērlo tvērd od smērti. Tako pripovēda prirodoslovac Schäfer, da je pužu odrezao glavu, koja mu je za nēko vrēme opet narasla. Isto je bilo i s njegovimi rožčići. Jednoć već pod jesen odrezao je pužu glavu, a ovaj je ipak zatvorio svoju spužnicu. Zimi mu je dakako polagano rasla glava, ali s prolēlja mu je do skora narasla.

Nu ja se nadam, da neće ovo nijedan od mojih mladih čitalacah kušati, jer bi tim pokazao, da je vèrlo tvrèda sèrca. Sander opet pripovèda, kako je jednoć imao puževah, koji su 1½ godine danah živili bez svake hrane, a ipak su izpuštali mnogo sluzi i blata.

Obručanka dragocèna (echte Wendeltreppe) je čunjasta, blèda, suro-žuta ili sasma bèla. Visoka je do dva palca; a jedan palac debela. Nalazi se i na cejlon-skih obalah. U prijašnje doba platjali sa za njezinu spužnicu do 600 for; pred 20 godinah do 100 for, a sad ju možeš dobiti za 12—15 for.

Čigraš (Kreisel-schnecke, tabl. 17, sl. 2.) živi u srèdozemnom moru. Vretenasta njezina kućica slična je čigru (zvrèku). Ticala su joj dugačka; boje je zelenkaste; a duga je 2 palca.

Čunjak (Kegelschnecke, tabl. 17, sl. 8), vèrlo je strašljiva životinjica, koja rèdko kad izlazi iz svoje prilično teške kućice; giblje se vèrlo tromo. Ima ih mnogo vèrstih, te živu u svih morih. Kućice su im ponajviše lèpo pisane. Najveće velike su i 6 palcakah.

Pozlatka ili zlatinka (Meerohr, tabl. 17, sl. 3.), ima veliko ustje, vèrlo kratke zavoje, uz duž lèva okrajca su rupice. Kućica jes nutra šarena i krasne biserne svètlosti; s vana je prosta, zeleno i smedjo-pègava, smežurena i nabrana. Živi u srèdozemnom moru. Od pužnice prave se svakojaki nakiti.

Nejasitka (Pelikanfuss, tabl. 17, sl. 5.) je dva palca duga; inače sivkaste boje. Živi u svih europejskih morih; nu najviše ih ima u srèdozemnom i jadranskom.

moru. Dèrži se pèskovitih i glibovitih mēstah. Meso joj jedu. Love ju ponajviše poslē burna vremena.

Tigrovka (Tiger-Porzellan-Schnecke) je modrastobēla, s mnogimi cèrnkasto-smedjimi, velikimi pēgami. U dužini ima 4 palca; nadje se i kao pēst velikih tigrovkah. Žive u iztočnoj Indiji na pèskovitih obalah. Bave se ponajviše pod pèskom. Kada je pun ili mlad mēsec, izadju noćju iz pēska, i obēse se medju hridinami. Iz njezine kućice prave se vèrlo krasne burmutice, pa ih upravo zato love na veliko. Ako hoće lovci da ostane kućica lēpa, moraju tigrovku u vrućoj vodi umoriti, te odmah sve meso izvaditi, jer bi drugčije izgubila spužnica lēpu svoju boju i sjajnost.

Trublja (Tritonshorn) je krasnobēle, cèrvene ili višnjaste boje. Duga je do 1½ stope. Kućica je čunjasta. Ustje je cèrveno. Živi u azijatskih morih, ponajviše pod vrućim podnebjem. Na mnogih tamošnjih otocih rabe ju kao trublju, odkuda joj i ime. Tatari služe se njom dan danas kao trubljom. Cèrvenkasto njezino meso jedu. Vèrlo je tusta. U njezinu želudcu nadje se kamenja, školjkah i koraljah. Znamenito kod njezine kućice je to, što žamori, kad ju uhu primakneš. Ako hoćemo da zadèrži ova kućica svoju lēpu boju i sjajnost, moramo ju svake druge godine na pol dana u slanu vodu zamočiti i onda na suncu posušiti. To isto valja nam činiti i s kućicom tigrovkinom.

Slonov zub (Elephanten-Meerzahn, tabl. 17, sl. 7.) kućica mu je cèvkasta, s obiuh stranah otvorena, nešto za-

vita. Ima ih raznih vèrstih i veličine. Živi u svih morih, a imenito u srèdozemnom. Dèrži se u mulju.

Puževi imaju na glavi ticala (rožčice), koja mogu uvući, i oči; na tèrbuhu je širok podplat, kojim gmižu; kože su nježno smežurane. Ponajviše žive u vodi, a na vlastito u moru, samo někoji u sladkoj vodi i na kopnu po vlažnih mèstih; ovi hrane se biljem, a morski većinom živinskimi tvarmi. Većina ih ima zavojitu kućicu, koja se spužnicom ili pužalinom zove, i u koju se može puž ili stranom ili sasvim uvući. Te su pužnice vèrlo različita oblika, veličine i boje. U vapnenih i pèščanskih gorah ima sila svake ruke okamenjenih spužnicah.

III. Ljušturnjaci.

(Muschelthiere.)

Velika bezzubka (die grosse Teichmuschel) ima 6—7 palacah duge, tanke, kèrhke, jajaste, pljosnate ljušture, koje su svana upèrljano-žutkaste sa zelenimi, žutkasto-smedjimi i žutkastimi susrèdnimi prugami nacèrtane. Obe jednake ljušture skopčane su na hèrbtu opružnim vezom. Medju ljušturami nalazi se životinja, koja ima žutkasto mehko truplo bez glave i bez čvèrstih čestih. Na strani tèrbuha nalazi se mesnati produžak, noga; koju može životinja izmedju ponèšto otvorenih školjkah izpružiti i tako u mehkom blatu polagano okolo plaziti. Ima ih u stojećih i lagano tèkućih vodah, u močvarah, ribnjacih i u jarcih. Meso se nejede. Školjku rabe gdèkad za skupljanje skorupa (vèrhnja) na mlèku.

Lisanka (Malermuschel, tabl. 17. sl. 1.) je dugoljasto-oblja, prema zadnjoj strani poput kljuna uža. Boje je zelenkasto-žute. Ima ih u svih rěkah. Kad metnemo lisanku na tanjur, te ju polijemo vodom, izpruži odmah nogu, te počme svojimi dihalj vodu upijati i izštěrcavati. U školjkah čuvaju slikari svoja mastila. U někojih krajevih kupe lisanke, kuhaju ih u vodi, pa njimi svinje hrane i školjke prodavaju. Duga je 3—4, a široka $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ palca.

Rěčna bisernica (Fluss-Perlmuschel) je dugoljasto-oblja; boje je měrke. Dužina joj iznosi $3\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$ palca. Ima u njih kadšto bisera. Žive u rěkah i potocih, po imenu u Českoj u rěci Vltavi. Bisernice otvaraju se širokim nožem, i ako se nadje u školjki zrěli biser, izvadi se, pa se opet spusti u vodu. Ako nije biser još sasma zrěo i čist, spravi se bisernica na stanovito město u rěci, pa se čeka, dok dozrije. Biser od rěčnih bisernicah nije tako dragocěn kao od morskih ili pravih, ali se je ipak već platjalo za jedan jedincati komad bisera 1.500 forintih.

Prava bisernica (Perlmuttermuschel) ima višeput i 10 palacah u proměru. Inače je gotovo četvero-uglasta oblika. Živi osobito uz obale otoka Cejlona i Brazilije i persijskom zalěvu i t. d. Ljuštura je poznata kao sedef (Perlmutter), pa se iz nje prave razni uresi i kitnice. Od nje dobiva se pravi biser. Biseri su světla zěrnca, sastavljena iz iste tvari, kojom su i školjke s nutra pokrite. Biser postaje ili iz sitnih, medju školjke dospělih kamenčićah, dočim světlom biserinom obrastu, ili pako tim, da se probušene utline u školjkah istom biserinom

izpune. Zato se tvorenje bisera može takodjer umjetno tim pospješiti, da se školjke bisernice probuše, ili se medju nje metnu sitni kamenčići ili sitna biserna zèrna, pa se bisernica spusti opet u more, dok se zèrna izpune. Bisernice traže osobito za to izvežbani gnjurači (Taucher), ali taj je posao vrlo opasan. Uz obale otoka Cejlona i drugih iztočno-indijskih otokah počimlju vaditi bisernice koncem mēseca travnja. Love ih na mēstih 4—12 hvatah dubokih, pa kad su ih uhvatili, otvore, pa ih metnu na sunce, dok životinjica sasma sagnjije, pa stopèrv onda izvade biser. U nēkih školjkah neima nijednoga, u drugih pako 10—12, pače i 20 zèrnah bisera. Biser je razne veličine; pače već su ga našli i kao lēšnjak velika. U perzijskom zalēvu našli su jednoč zèrno bisera, koje se je cēnilo da je vrēdno 700.000 for. Republika mlētačka poklonila je nēkoć turskomu caru zèrno bisera u cēni od 150.000 for., a posljednja egipatska kraljica Kleopatra izpila je nēkom prigodom u octu raztvoreno zèrno bisera u cēni od 500.000 for. Bisera ima razne boje, naime cērnkaste, zelenkaste, žutkaste, pepeljaste ili srebèrnastobēle, a ovaj posljednji cēne u Europi najviše. Čim je biser bolji, tim se jače sjaje i boje prelēva. Źalibože da biser za 20—30 godinah skoro sasma izgubi svoju sjajnost; nu Hindustanci znadu naēin, kojim mu se može povratiti priašnja sjajnost, premda ta nija već onako čista kao u pravoga i prvobitnoga bisera.

Rizkećana kamenica (Neptunsdose, tabl. 17, sl. 4.), je jedna od najlēpših ljušturah. Obē školjke nisu jednako svedene, dolnja naime je nēšto plosnatija sa le-

pezovitimi (fächerförmig) gèrbicami. Boju ima koričnu, kavastu ili oèrveno-žutu sa bělimi ili plavkastimi pègicami, potezi ili oblaćíci. Živi i istočnoj Indiji i na otoku Jamajki.

Zeva velika ili golema školjka (Riesenmuschel) duga je 3—5 stopah i do 5 centih težka. Boje je běle, s nutra žutkasto-běle. Inače je to životinja prilično ružna. Ima něku rojtu debela i žilava konca, kojim se tako čvèrsto dèrži pećinah, da ju moraju sèkirom odsěci. A okrajci školjkah tako su oštri, da može zeva zatvarajuć ih i najdeblja užeta presěci, kao da bi ih najoštrijim nožem prerezao. Meso joj se jede; nu ljudi, ako žele tu životinju izvaditi iz školjke, treba da postupaju vèrlo oprezno kod svoga posla; jer im može zeva lahko presěci ruku. S toga joj meću kakov kamen u otvorene školjke, da ih nemože zatvoriti. Zatvorene školjke nemožeš nikakovom silom otvoriti, osim ako prerežeš kopče, kojimi su spojene.

Plemenita butovka (edle Steckmuschel) je sivo-cèrvenkasta, pa ima puno osovljenih, natrag zavnutih ljsakah poput bodljikah. Živi u sredozemnom moru i u atlantičkom oceanu. Ljuštura je duža od stope, utaknuta je ostrim krajem u glib ili pèsak morskoga poloja, a bradom prihvaća se za dno; ta je brada duga preko 6 palacah, ugasito-maslinkasta, svètla, čvèrsta i nježna vlakna, te se prodaje pod imenom morske svile (Muschelseide). Iz ove svile prave se rukavice, čarape itd. Butovku love ponajviše kod Napulja. Ribari jedu njeno meso.

Ostriga (Auster) ima gotovo okrugle, debele ljušture, koje su s vana krastave i drozgave (blätterig); s vana je žutkasto-smedja ili smedjasto-běla, i zeleno, oèr-

veno ili ljubičasto šatirana; a s nutra kao mlěko běla a městimice se sjaje kao sedef (Perlmutter.) Sasvim odrasla ostriga velika je kao dlan. Živu u svih europskih morih uz obale, gdje nije odviše duboko; najvole kakov prostor nedaleko ustja koje rěke. Svojom dubljom školjkom pripili se na pećine i druge predmete; obično vise u hěrpah, jedna uz drugu, te sačinjavaju tako tim tako zvano ostržište (Austerbank). Giblju se samo razklapajuć i sklapajuć svoje ljuštore; dolje se nemiću. Razklapajuć ljuštore dobivaju morske vode, koje im treba za dihanje, i u kojoj ima za nje hrane. Hrane se, kako mnogi misle, nevidi (Infusorien) i drugim manjimi morskim životinjama. Razplodjuju se jaji. Leeuwenhoek je proračunao, da ima jedna jedincata ljuštura do 4 milijuna jajah. Jaja nose obično mēseea svibnja, a u to vrěme je u někojih zemljah, naime u Englezkoj, lov na ostrige strogo zabranjen. Ostriga doraste istom za 4 godine. Love ih posebnimi vėrlo čvėrstimi mrěžama; u jednu takvu mrěžu uhvate ih kadšto do 1000 komadah na jedan put. Prama vlastitosti zemlje i mora u kojem žive, jesu i ostrige različita teka. Najbolje su englezke a osobito one, koje su s vana zelenkaste boje. U Austriji ima velikih ostržištah u Těrstu i Mlěteih. Ostrige žive razpošiljaju u posebnih bačvah, gdje ih toliko natěrpaju, da se nemože nijedna otvoriti. Obično se jedu sirove s limunovim sokom. Ima ljudih, koji pojedu najedanput do 100 komadah. Osim toga jedu se i pečene kao i raznim drugim načinom pripravljene. Ljuštore njihove rabe se kao gnoj, a osim toga

pravi se iz njih lem (Kitt). Tko ih izžee, dobije od njih prilično čisto vapno.

Ladjar (Pfahl-iliBohrwurm) priliči pravomu cèrvu. U dužini ima 6 i više palacah. Obično je gljistine debljine, nu ima ih i kao pèrst debelih. Tělo mu stoji u vapnenoj cěvi, koja se oko njega napravi. Ladjar pravi silnu štetu na brodovih, morskih nasipih, a obće na svih stupovih, što no su u moru. On se naime prednjom stranom těla upili u dèrvo, te ga izprovèrta na sve strane tako, da nije više za nikakovu porabu. Ladjar je upropastio već mnogo brodovah, s toga, da mu se kako tako obrane i brod sačuvaju, okuju ga mornari obično bakrom; a to isto rade sa svimi stupovi, što no je u lukah zabičaju u more. Osobito pako čini u Holandiji golemu štetu. Někoi naime krajevi uz morsku obalu leže niže od samoga mora, s toga morali su Holandezi podići velike nasipe, da se more nerazlije tom nizinom. U tih nasipih ima vèrlo mnoga dèrvenih stupovah, koje su ladjari već nekoliko putah tako izkvarili, da je sva Holandija pala u najveću pogibelj. — Ladjar donešen je u Europu iz vrućih krajevah.

Bezzubka, lisanka, bisernica, kamenica, zeva, butovka, ostriga i ladjar spadaju u razred **ljušturnjakah**. Neimaju glave. Cěla životinja pokrita je dvocrèpastom kućicom, koja je na hèrbtu spojena posebnimi kopčami. Kućice su oblikom, naslikom, bojom i nasěkom vèrlo različne. Ta životinja može svoje školjke otvoriti i zatveriti. Mnogi ljušturnjaci priraštjeni su

čvrsto na dnu vodah svojimi ljušturami ili posebnimi nekimi dlakastimi čuperci, dočim drugi pomoću neka kova mesnata puzala ili noge mogu i puzati. Ljušturnjaci žive samo u vodi, ponajviše u moru, a samo neki od njih u sladkoj vodi. Njke jedu, a od nekkih drugih rabe se ljušture ili vlakna.

IV. Plaštenjaci.

(Mantelthiere.)

Velika svétljka (grosse Feuerscheide, tabl. 17., sl. 6.) je 3—4 palca dugi 1—3 palca širok valjak, plivajući osvoljen u moru, a po njem su pojedine dugoljaste životinjice nepravilno razsute. Širenjem i stezanjem svih pojedinih životinjah na jedan put pliva valjak u moru, i sjaje po noći kao kakov ogarak najkrasnijimi bojami. Svétljkah ima više vèrstih, koje žive po najviše u morih vrućega podnebjja; ali ima ih i u sredozemnom moru.

Plaštenjaci neimaju glave, noguh niti kućice, već su obaviti nekim usminatim, poput vreće sraslim plaštem. Ovo su najnesavèršeniji mekušci.

Glavonožci, puževi, ljušturnjaci i plaštenjaci spadaju u rod **mekušacah**. Tělo im je mekano, a izvana oděveno mehkom i sluzavom kožom, koju zovemo plaštem; iz nje razvije se tvèrda kućica. Žive ponajviše u vodi, a samo nekoi stanuju na kopnu i to na vlažnih městih.

K a z a l o.

	Strana		Strana
Ajkula	40	Hobotnica obična	56
Bakalar	44	Hvojnik	24
Balavac obični	58	Iver	46
— veliki	60	Jaglun	48
Barakula	43	Jaram	41
Bazilisk	7	Jegulja	50
Bezzubka	63	Jesetra obična	38
Bežmek	49	Kajman	9
Bělouška	12	Kalar	46
Běluga	39	Kamenica	65
Běllica	31	Karas	30
Bisernica řečna	64	Kečiga	39
— prava	64	Kerkuša	30
Bistranga	32	Konjić morski	54
Butac	54	Kornjača	1
Butovka plemenita	66	Krastača	25
Černokèrvka obična	57	Krivosas	14
Čegèrtuša	19	Krilaš	54
Čigraš	61	Kučak	40
Čověčka ribica	27	Kvakuša	25
Čunjak	61	Ladjar	68
Daždenjak	26	Ladjica obična	57
Dèrhtulja	42	Legvan	6
Dvoličnjak	6	Linjak	31
Fanfara	49	Lisanka	64
Gavial	10	Losos	31
Gèrgeč	49	— cèrveni	33
Gušterica	4	Mačka morská	41
Hèrženica	25	Manjak	47

	Strana		Strana
Močarila	27	Šaran zlatni	30
Moruna	39	Školjka golema	66
Naočarka	21	Štuka	35
Nejasitka	61	Štur vodeni	27
Obručanka	61	Tèrnka	42
Okatica	53	Tigrovka	62
Ostriga	66	Tovar obièni	46
Pastèrya	32	Treska	44
Pěskuša	19	Trublja	62
Pilan	42	Tun	47
Pipa amerik.	26	Udav obièni	13
Piškori	54	— povodni	13
Poletuša	37	Ugor	50
Pozlatka	61	— dèrhtavac	52
Psoglavka nilska	8	Usonjača	4
— seheljska	9	Vuk morski	48
Puž jedatan	60	Zelembač	5
Ridovka	18	Zeva	66
Rubac veliki	46	Zlatinka	61
Sèrdelja	35	Zmaj	7
Sèrdeljica	35	Zub slonov	62
Skrižalica	2	Žaba krastava	25
Skuša obièna	48	— zelena	25
Sled	38	Željva	1
Slěpiè	11	— orěpovita	3
Smudj	50	— evropejska	2
Som	37	— gèrčka	2
— dèrhtavac	38	— golema	3
Svètiljka	69	Žutuga	43
Šaran obièni	29		

Pregled slikah.

Tabla 13.

	Strana
1. Gèrčka željva	2
2. Skrižalica	2
3. Crěpovita željva	3
4. Europejska željva	2
5. Golema željva	3
6. Kajman	9
7. Legvan	6
8. Daždenjak	26

Tabla 14.

1. Čegertuša	19
2. Naočarka	21
3. *) Udav obični	13
4. Dvoličnjak	6
5. Bazilisk	7
6. Zeleni zmaj	7
7. Ridovka	18

Tabla 15.

1. Fanfara	49
2. Morski konjić	54
3. Kečiga	39
4. Okatica	53
5. Ugor ili jegulja	50

	Strana
6. Kućak ili ajkula	40
7. Butac	54
8. Jaram	41
9. Bežmek	49
10. Morski vuk	48

Tabla 16.

1. Krilaš	54
2. Kèrkuša	30
3. Sled	33
4. Som	37
5. Manjak	47
6. Červeni losos	33
7. Štuka	35
8. Tun	47

Tabla 17.

1. Lisanka	64
2. Čigraš	61
3. Pozlatka	61
4. Kamenica	65
5. Nejasitka	61
6. Světiljka velika	69
7. Slonov zub	62
8. Čunjak	61

*) Ove deblje brojke neka se veliki čitatelj izpravi ti na dotičnih stranah.



Meister
Buchbinder

1871



an
laure.

